



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NASIONALE
SENIOR SERTIFIKAAT**

GRAAD 12

JUNIE 2017

FISIESE WETENSKAPPE V2

PUNTE: 150

TYD: 3 uur



Die vraestel bestaan uit 20 bladsye, insluitend datablaaie.



INSTRUKSIES EN INLIGTING

1. Skryf jou volle NAAM en VAN in die toepaslike spasies op jou ANTWOORDEBOEK.
2. Hierdie vraestel bestaan uit AGT vrae. Beantwoord AL die vrae in jou ANTWOORDEBOEK.
3. Begin ELKE vraag op 'n nuwe bladsy in die ANTWOORDEBOEK.
4. Nommer die vroeg korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik is.
5. Laat EEN reël oop tussen twee subvrae, byvoorbeeld tussen VRAAG 2.1 en VRAAG 2.2.
6. Jy mag 'n nieprogrammeerbare sakrekenaar gebruik.
7. Jy mag toepaslike wiskundige apparaat gebruik.
8. Jy word aangeraai om die aangehegde GEGEWENSBLAAIE te gebruik.
9. Toon ALLE formules en substitusie in ALLE bewerkings.
10. Rond jou finale numeriese antwoorde tot 'n minimum van TWEE desimale plekke af.
11. Gee kort verduidelikings, motiverings, ensovoorts, waar nodig.
12. Skryf netjies en leesbaar.

VRAAG 1: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE

Vier opsies word as moontlike antwoorde op die volgende vrae gegee. Elke vraag het slegs EEN korrekte antwoord. Kies die antwoord en skryf slegs die letter (A–D) langs die vraagnommer (1.1–1.10) in die ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld 1.11 E.

- 1.1 'n Potensiële energie-diagram vir 'n hipotetiese reaksie word hieronder getoon:



Die ΔH vir die reaksie, in kJ/mol, is ...

- A 17.
 - B -17.
 - C 25.
 - D -25.
- (2)

- 1.2 Watter paar verbindings verteenwoordig ONVERSADIGDE koolwaterstowwe?


- A Alkene en Alkyne
 - B Alkane en Alkyne
 - C Alkane en Alkene
 - D Alkohole en Alkene
- (2)

- 1.3 'n Atoom, groep atome of 'n binding wat 'n groep organiese verbindings se kenmerkende fisiese en chemiese eienskappe gee, word 'n ... genoem.

- A polimeer.
 - B monomeer.
 - C funksionele groep.
 - D homoloë reeks.
- (2)


- 1.4 Watter EEN van die volgende stellings is altyd WAAR ten opsigte van die verband tussen die sterkte van intermolekulêre kragte en kookpunt?
- A Die kookpunt is direk eweredig aan die sterkte van die intermolekulêre kragte.
 - B Soos die sterkte van die intermolekulêre kragte toeneem, neem kookpunt toe.
 - C Soos die sterkte van die intermolekulêre kragte toeneem, neem kookpunt af.
 - D Soos die sterkte van die intermolekulêre kragte toeneem, word die kookpunt nie geaffekteer.
- (2)

- 1.5 In die vloeidiagram hieronder, verteenwoordig **P** en **Q** twee organiese verbindings.





Watter EEN van die volgende is die KORREKTE gekonsentreerde molekulêre formule vir die verbinding **Q**?

- A CH_2CH_2
 - B CH_3CH_3
 - C $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Br}$
 - D $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$
- (2)
- 1.6 In 'n homogene reaksie is die reaktante en die produkte altyd ...
- A gasse.
 - B vloeistowwe.
 - C vaste stowwe.
 - D in dieselfde fase.
- (2)
- 1.7 Watter EEN van die volgende veranderings sal NIE die tempo waarteen suurstof gevorm word, BEÏNVLOED NIE?



- A Drukverhoging
 - B Temperatuurverhoging
 - C Byvoeging van 'n gesikte katalisator
 - D Verhoog die konsentrasie van H_2O_2
- (2)

- 1.8 Die volgende grafiek toon die verband tussen die ewewigkonstante K_c en die hoeveelheid \mathbf{X} vir die hipotetiese reaksie.



Watter hoeveelheid word deur die \mathbf{X} op die horisontale as voorgestel?

- A Massa
- B Druk
- C Temperatuur
- D Konsentrasie

(2)


- 1.9 'n Sterk suur word met 'n basis getitreer. Die dissosiasie konstante vir die basis, K_b is $2,8 \times 10^{-6}$ by 25°C .

Watter EEN van die volgende indikators sal die mees gesikste vir die titrasie wees?

Indikator	pH gebied waar indikator van kleur verander
A	4,2 tot 6,2
B	6,0 tot 7,6
C	8,0 tot 9,6
D	10,0 tot 12

(2)

- 1.10 Chromaat (geel oplossing) en dichromaat ione (oranje oplossing) is in ewewig met mekaar en 'n waterige oplossing volgens die volgende gebalanseerde vergelyking:



Geel

Oranje

Watter EEN van die volgende veranderings moet gemaak word om die kleur van die oplossing oranje te maak?

- A Voeg meer H_2O by
- B Verlaag die pH
- C Verhoog die pH
- D Verhoog $[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$

(2)
[20]

VRAAG 2

Die letters **A** tot **H** in die tabel verteenwoordig agt organiese verbindings.

A	$\begin{array}{c} \text{Br} \\ \\ \text{CH}_3\text{CHCHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_2\text{CH}_3 \end{array}$	B	$\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CCH}_2\text{CH}_3 \end{array}$
C	$\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$	D	Metiel etanoaat
E	2,3-dimetielbutaan	F	$\left[\text{CH}_2 - \text{CH}_2 \right]_n$
G	Ethanoësuur	H	C_nH_{2n}

2.1 Skryf neer die letter wat verteenwoordigend is van 'n verbinding wat:

- 2.1.1 'n Proton donor is (1)
- 2.1.2 'n Groot molekule wat gevorm is uit klein monomeer eenhede wat kovalent in 'n herhalende patroon gebind is (1)

2.2 Skryf neer die:

- 2.2.1 ALGEMENE FORMULE vir die homoloë reeks waaraan verbinding **E** behoort (1)
- 2.2.2 NAAM van die funksionele groep wat in verbinding **G** gevind word (1)
- 2.2.3 EMPIRIESE FORMULE van verbinding **H** (1)

2.3 Skryf neer die IUPAC-naam vir:

- 2.3.1 Verbinding **A** (3)
- 2.3.2 Verbinding **B** (2)
- 2.3.3 'n FUNKSIONELE-ISOMEER van verbinding **G** (2)

2.4 Skryf neer die STRUKTUURFORMULE van verbinding **E**. (2)

2.5 Verbinding **D** word berei van die reaksie van 'n karboksielsuur en 'n alkohol in die teenwoordigheid van 'n anorganiese suur-katalisator. 'n Waterbad word gebruik om die reaksie-mengsel te verhit.

Skryf neer die:

2.5.1 NAAM of FORMULE van die anorganiese suur-katalisator (1)

2.5.2 STRUKTUURFORMULE van verbinding **D** (2)

2.5.3 Eienskap van alkohole wat veroorsaak dat 'n waterbad nodig is om die reaksie-mengsel te verhit in plaas van direkte hitte (1)

2.6 Verbinding **C** is 'n TERSIËRE alkohol.

Skryf neer die STRUKTUURFORMULE en IUPAC-naam van verbinding **C**. (4)

2.7 Skryf neer die MOLEKULËRE FORMULES van die TWEE produkte wat tydens die algehele verbranding van verbinding **E** gevorm word. (2)

[24]

VRAAG 3

Leerders gebruik alkohole **A** tot **C** om 'n faktor wat die kookpunte van alkohole beïnvloed, te ondersoek.

- 3.1 Definieer die term *kookpunt (boiling point)*. (2)

Verbindings	Alkohole
A	CH ₃ OH
B	CH ₃ CH ₂ OH
C	CH ₃ CH ₂ CH ₂ OH

- 3.2 Vir hierdie ondersoek skryf neer die:

3.2.1 Onafhanklike veranderlike (1)

3.2.2 Apparaat wat gebruik word om die kookpunt te meet (1)

- 3.3 Watter EEN van die drie verbindings het die HOOGSTE kookpunt? (1)

- 3.4 Verduidelik jou antwoord in VRAAG 3.3. (3)

- 3.5 Die leerders vergelyk nou die kookpunte van verbindings **D** en **E**, soos in die tabel hieronder getoon. Verbindings **D** en **E** behoort aan verskillende homoloë reekse.

	Verbindings	Kookpunte (°C)
D	Etanol	78,1
E	Etanaal	20,2

3.5.1 Definieer die term *homoloë reeks*. (2)

3.5.2 Verduidelik volledig waarom die kookpunt van verbinding **D** HOËR is as dié van verbinding **E**. (4)

3.4.3 Watter EEN van die verbindings **D** of **E** het die HOOGSTE dampdruk? Gebruik inligting uit die tabel om 'n rede te gee. (2)
[14]

VRAAG 4

Die vloeidiagram hieronder toon drie organiese reaksies wat die verbinding 2-broombutan bevat.

Reaksie A: Alkaan + Y \longrightarrow 2-broombutan + HBr

Reaksie B: 2-bromobutan + KOH \longrightarrow Verbinding X + KBr + H₂O

Reaksie C: 2-bromobutan + KOH \longrightarrow Alkohol + KBr

4.1 Skryf neer die tipe reaksie wat verteenwoordig word deur:

4.1.1 Reaksie A (1)

4.1.2 Reaksie B (1)

4.2 Vir reaksie A, skryf neer die:

4.2.1 NAAM of FORMULE van die anorganiese reaktant Y (1)

4.2.2 Een reaksie toestand nodig vir die reaksie om plaas te vind (1)

4.2.3 IUPAC naam van die alkaan. (2)

4.3 Skryf neer die STRUKTUURFORMULES van verbinding X, die hoof organiese produk in Reaksie B. (2)

4.4 Skryf neer die STRUKTUURFORMULE van die alkohol wat in Reaksie C geproduseer was. (2)

4.5 In beide reaksies B en C word dieselfde inorganiese reaktant KOH gebruik.
Skryf neer TWEE reaksie toestande wat die vorming van Reaksie C teenoor Reaksie B sal bevoordeel. (2)

[12]

VRAAG 5

'n Groep leerders gebruik die reaksie tussen soutsuur en magnesium lint om die faktore te ondersoek wat die reaksietempo beïnvloed. Die gebalanseerde vergelyking vir die reaksie word hieronder gegee:




Die soutsuur is in OORMAAT en dieselfde massa magnesium word in AL die eksperimente gebruik.

Eksperiment	REAKSIE-TOESTANDE			
	Konsentrasie van HCl(aq) (mol.dm ⁻³)	Temperatuur (°C)		Toestand van verdeling van 0.24 g Magnesium
		Voor	Na	
1	2	35	57	poeier
2	2	30	48	lint
3	2	20	33	lint
4	1,5	30	45	lint

- 5.1 Definieer *reaksietempo*. (2)
- 5.2 In watter eksperiment is die reaksietempo die HOOGSTE? Gee TWEE redes. (3)
- 5.3 Die reaksie in **Eksperiment 2** word met die reaksie in **Eksperiment 4** vergelyk.
- 5.3.1 Skryf neer EEN beheerde veranderlike vir hierdie vergelyking. (1)
- 5.3.2 Hoe vergelyk die hoeveelheid waterstof gas gevorm in **Eksperiment 2** met die hoeveelheid wat in **Eksperiment 4** gevorm word as dieselfde volume suur in beide eksperimente gebruik word?
- Skryf slegs HOËR AS, MINDER AS of GELYK AAN. Gee 'n rede vir jou antwoord. (2)
- 5.4 Gee 'n rede waarom jy nie die reaksietempo van **Eksperiment 1** kan vergelyk met die reaksietempo van **Eksperiment 3** nie. (1)
- 5.5 Bereken die massa van die soutsuur wat oorbly in die fles by die voltooiing van die reaksie in **Eksperiment 1** in die aanvanklike volume van die soutsuur 80 cm³ is. (7)


- 5.6 Die Maxwell-Boltzman verspreidingskurwes gemerk **P**, **Q** en **R** vir die reaksies in eksperimente 1, 2 en 3 word in lukrake order word hieronder getoon.



- 5.6.1 Skryf neer die naam van die byskrif, **Y**, op die vertikale as. (1)
- 5.6.2 Watter kurwe (**Q**, **P** of **R**) verteenwoordig die resultate van **Eksperiment 3**? (1)
- 5.6.3 Met verwysing na die botsings-teorie, verduidelik die effek van temperatuur op die reaksietempo. (4)
[23]

VRAAG 6

Die volgende reaksie bereik chemiese ewewig in 'n geseëlde houer by 70 °C.



6.1 Defineer die term *chemiese ewewig*. (2)

6.2 Watter effek het die volgende veranderinge op die aantal mol NO₂ by ewewig?


Skryf slegs NEEM TOE, NEEM AF of BLY DIESELFDE.

6.2.1 Voeg meer N₂O₄ in die houer. (1)

6.2.2 Vermeerder die druk deur die volume te verminder. (1)

6.3 Deur na Le Chatelier se beginsel te verwys, verduidelik jou antwoord in VRAAG 6.2.2. (3)

6.4 Die volgende grafiek toon die verandering in die konsentrasie van N₂O₄ teenoor tyd.



Teken die grafiek oor op dieselfde stel asse en gebruik 'n stippellyn om die grafiek te teken wat verkry sal word wanneer 'n katalisator by die reaksie mengsel aan die begin van die reaksie gevoeg word. (2)


- 6.5 Die tabel hieronder toon die waardes van die ewewigskonstante K_c vir die reaksie by verskillende temperature.

Temperatuur (°C)	K_c
23	8,03
70	0,32
100	0,067

- 6.5.1 By watter temperatuur is NO_2 opbrengs die hoogste?
Gee 'n rede. (2)
- 6.5.2 Wanneer die reaksie ewewig bereik by 70 °C, word gevind dat die konsentrasie van die N_2O_4 in die ewewig-mengsel $0,5 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ is.
Bereken die aanvanklike konsentrasie van die N_2O_4 . (7)
- 6.5.3 Is die voorwaartse reaksie ENDOTERMIES of EKSOTERMIES?
Met die hulp van die inligting in die tabel en Le Chatelier se beginsel, verduidelik jou antwoord volledig. (4)
[22]

VRAAG 7

- 7.1 Etanoësuur is 'n monoprotiese suur wat ioniseer in water volgens die volgende reaksie:



- 7.1.1 Definieer die term *monoprotiese suur*. (2)
- 7.1.2 Skryf die NAAM of FORMULE van die gekonjugeerde basis van etanoësuur neer. (1)
- 7.1.3 Is etanoësuur 'n STERK of 'n SWAK suur?
Verwys na die gegewe inligting om 'n rede te gee. (2)
- 7.2 'n Natriumhidroksied-oplossing (NaOH) het 'n konsentrasie van $1 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

Bereken die:

- 7.2.1 pH van die oplossing (4)
- 7.2.2 Volume waartoe 10 cm^3 natrium hidroksied oplossing verdun moet word om 'n oplossing met 'n konsentrasie van $1 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ te verkry (3)
- 7.3 'n Sekere verbinding het natriumkarbonaat (Na_2CO_3) as die hoof bestanddeel. Om die hoeveelheid natriumkarbonaat teenwoordig in die monster te bepaal, is 100 cm^3 van 'n $0,8 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ oplossing swawelsuur tot die monster in 'n fles bygevoeg.

Die swawelsuur-oplossing is in OORMAAT.

Die vergelyking hieronder toon die reaksie wat in die fles plaasvind.



- 7.3.1 Bereken die aantal mol van swawelsuur wat by die fles bygevoeg was. (3)


*Tydens 'n titrasie word 35 cm^3 van 'n $0,3 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ kaliumhidroksied oplossing neutraliseer dit die oormaat van die swawelsuur wat oorblý in **Reaksie 1** volgens die gebalanseerde vergelyking wat hieronder getoon word:*




- 7.3.2 Bereken die massa van die natriumkarbonaat teenwoordig in die monster. (8)
- 7.4 Skryf neer die gebalanseerde vergelyking vir die hidroliese van natriumkarbonaat (Na_2CO_3). (3)
- [26]

VRAAG 8

Die grafiek toon die persentasie opbrengs van NH_3 , gevorm in die reaksie hieronder, teenoor druk by verskillende temperature soos in die grafiek getoon.



GRAFIK VAN PERSENTASIE OPBRENGS BY VERSKILLEnde TEMPERATURe TEENOOR DRUK



8.1 Skryf neer:

- 8.1.1 In woorde, die verwantskap tussen temperatuur en persentasie opbrengs by konstante druk vir hierdie reaksie (2)
- 8.1.2 Die persentasie opbrengs by 'n temperatuur van 350 °C en 'n druk van 100 atmosfeer (1)
- 8.1.3 Die druk waarby die persentasie opbrengs 40% by 450 °C is (1)

8.2 Presies 112 gram stikstofgas was toegelaat om te reageer met waterstofgas in 'n geslote houer. Die reaksie bereik ewewig by 'n temperatuur van 350 °C en by 'n druk van 200 atmosfeer.

Bereken die werklike opbrengs NH_3 . (4)
[8]

TOTAAL: 100

**NATIONAL SENIOR CERTIFICATE
NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT**

**DATA FOR PHYSICAL SCIENCES GRADE 12
PAPER 2 (CHEMISTRY)**

**GEGEWENS VIR FISIESE WETENSKAPPE GRAAD 12
VRAESTEL 2 (CHEMIE)**

TABLE 1: PHYSICAL CONSTANTS/TABEL 1: FISIESE KONSTANTES

NAAM/NAME	SIMBOOL/SYMBOL	WAARDE/VALUE
Standard pressure <i>Standaarddruk</i>	p^θ	$1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$
Molar gas volume at STP <i>Molêre gasvolume teen STD</i>	V_m	$22,4 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
Standard temperature <i>Standaardtemperatuur</i>	T^θ	273 K
Charge on electron <i>Lading op elektron</i>	e	$-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Avogadro's constant <i>Avogadro se konstante</i>	N_A	$6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

TABLE 2: FORMULAE/TABEL 2: FORMULES

$n = \frac{m}{M}$ or/of $n = \frac{N}{N_A}$ or/of $n = \frac{V}{V_o}$	$c = \frac{n}{V}$ or/of $c = \frac{m}{MV}$ $\frac{c_a V_a}{c_b V_b} = \frac{n_a}{n_b}$	$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ $K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14}$ at /by 298 K
---	---	--

$$E^\theta_{\text{cell}} = E^\theta_{\text{cathode}} - E^\theta_{\text{anode}} / E^\theta_{\text{sel}} = E^\theta_{\text{katode}} - E^\theta_{\text{anode}}$$

$$E^\theta_{\text{cell}} = E^\theta_{\text{reduction}} - E^\theta_{\text{oxidation}} / E^\theta_{\text{sel}} = E^\theta_{\text{reduksie}} - E^\theta_{\text{oksidasie}}$$

$$E^\theta_{\text{cell}} = E^\theta_{\text{oxidising agent}} - E^\theta_{\text{reducing agent}} / E^\theta_{\text{sel}} = E^\theta_{\text{oksideermiddel}} - E^\theta_{\text{reduseermiddel}}$$

TABLE 3: THE PERIODIC TABLE OF ELEMENTS/TABEL 3: DIE PERIODIEKE TABEL VAN ELEMENTE

1 (I)	2 (II)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (III)	14 (IV)	15 (V)	16 (VI)	17 (VII)	18 (VIII)	2 He 4
1 H 1	2,1																	
3 Li 7	1,0 1,5																	
11 Na 23	0,9 1,2	12 Mg 24																
19 K 39	0,8 1,0	20 Ca 40	1,3 Sc 45	1,5 Ti 48	22 V 51	23 Cr 52	24 Mn 55	25 Fe 56	26 Co 59	27 Ni 59	28 Cu 63,5	29 Zn 65	30 Ga 70	31 Ge 73	32 As 75	33 Se 79	34 Br 80	35 Kr 84
37 Rb 86	0,8 1,0	38 Sr 88	1,2 Y 89	1,4 Zr 91	40 Nb 92	41 Mo 96	42 Tc 101	43 Ru 103	44 Rh 106	45 Pd 108	46 Ag 112	47 Cd 115	48 In 119	49 Sn 122	50 Sb 128	51 Te 127	52 I 131	53 Xe 131
55 Cs 133	0,7 0,9	56 Ba 137	57 La 139	1,6 Hf 179	72 Ta 181	73 W 184	74 Re 186	75 Os 190	76 Ir 192	77 Pt 195	78 Au 197	79 Hg 201	80 Tl 204	81 Pb 207	82 Bi 209	83 Po 209	84 At 209	85 Rn 131
87 Fr 226	0,7 0,9	88 Ra 226	89 Ac															
				58 Ce 140	59 Pr 141	60 Nd 144	61 Pm 150	62 Sm 152	63 Eu 157	64 Gd 157	65 Tb 159	66 Dy 163	67 Ho 165	68 Er 167	69 Tm 169	70 Yb 173	71 Lu 175	
				90 Th 232	91 Pa 238	92 U 238	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

TABLE 4A: STANDARD REDUCTION POTENTIALS
TABEL 4A: STANDAARD REDUKSIEPOTENSIALE

Half-reactions/Halfreaksies	E^θ (V)
$F_2(g) + 2e^- \rightleftharpoons 2F^-$	+ 2,87
$Co^{3+} + e^- \rightleftharpoons Co^{2+}$	+ 1,81
$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	+1,77
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$	+ 1,51
$Cl_2(l) + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$	+ 1,36
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$	+ 1,33
$O_2(g) + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	+ 1,23
$MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2H_2O$	+ 1,23
$Pt^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pt$	+ 1,20
$Br_2(l) + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^-$	+ 1,07
$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightleftharpoons NO(g) + 2H_2O$	+ 0,96
$Hg^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Hg(l)$	+ 0,85
$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$	+ 0,80
$NO_3^- + 2H^+ + e^- \rightleftharpoons NO_2(g) + H_2O$	+ 0,80
$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$	+ 0,77
$O_2(g) + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2O_2$	+ 0,68
$I_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2I^-$	+ 0,54
$Cu^+ + e^- \rightleftharpoons Cu$	+ 0,52
$SO_2 + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons S + 2H_2O$	+ 0,45
$2H_2O + O_2 + 4e^- \rightleftharpoons 4OH^-$	+ 0,40
$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$	+ 0,34
$SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightleftharpoons SO_2(g) + 2H_2O$	+ 0,17
$Cu^{2+} + e^- \rightleftharpoons Cu^+$	+ 0,16
$Sn^{4+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn^{2+}$	+ 0,15
$S + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2S(g)$	+ 0,14
$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g)$	0,00
$Fe^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Fe$	- 0,06
$Pb^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pb$	- 0,13
$Sn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn$	- 0,14
$Ni^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ni$	- 0,27
$Co^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Co$	- 0,28
$Cd^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cd$	- 0,40
$Cr^{3+} + e^- \rightleftharpoons Cr^{2+}$	- 0,41
$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Fe$	- 0,44
$Cr^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Cr$	- 0,74
$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$	- 0,76
$2H_2O + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g) + 2OH^-$	- 0,83
$Cr^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cr$	- 0,91
$Mn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Mn$	- 1,18
$Al^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Al$	- 1,66
$Mg^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Mg$	- 2,36
$Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na$	- 2,71
$Ca^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ca$	- 2,87
$Sr^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Sr$	- 2,89
$Ba^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ba$	- 2,90
$Cs^+ + e^- \rightleftharpoons Cs$	- 2,92
$K^+ + e^- \rightleftharpoons K$	- 2,93
$Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li$	- 3,05

TABLE 4B: STANDARD REDUCTION POTENTIALS
TABEL 4B: STANDAARD REDUKSIEPOTENSIALE

Half-reactions/Halfreaksies	E^θ (V)
$\text{Li}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}$	-3,05
$\text{K}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{K}$	-2,93
$\text{Cs}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cs}$	-2,92
$\text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ba}$	-2,90
$\text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sr}$	-2,89
$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ca}$	-2,87
$\text{Na}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Na}$	-2,71
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}$	-2,36
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}$	-1,66
$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}$	-1,18
$\text{Cr}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}$	-0,91
$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-$	-0,83
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	-0,76
$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}$	-0,74
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0,44
$\text{Cr}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}^{2+}$	-0,41
$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cd}$	-0,40
$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}$	-0,28
$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}$	-0,27
$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}$	-0,14
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}$	-0,13
$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}$	-0,06
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2(\text{g})$	0,00
$\text{S} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{S}(\text{g})$	+0,14
$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}^{2+}$	+0,15
$\text{Cu}^{2+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}^+$	+0,16
$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,17
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+0,34
$2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-$	+0,40
$\text{SO}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons \text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,45
$\text{Cu}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+0,52
$\text{I}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{I}^-$	+0,54
$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}_2$	+0,68
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0,77
$\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}$	+0,80
$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	+0,80
$\text{Hg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Hg}(\ell)$	+0,85
$\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$	+0,96
$\text{Br}_2(\ell) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Br}^-$	+1,07
$\text{Pt}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pt}$	+1,20
$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$	+1,23
$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	+1,23
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$	+1,33
$\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$	+1,36
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$	+1,51
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$	+1,77
$\text{Co}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}^{2+}$	+1,81
$\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{F}^-$	+2,87

Increasing oxidising ability/Toenemende oksiderende vermoë

Increasing reducing ability/Toenemende reduuserende vermoë



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

GRADE/GRAAD 12

JUNE COMMON PAPER 2017

**PHYSICAL SCIENCES P2/
FISIESE WETENSKAPPE V2
MEMORANDUM**

MARKS: 150

This memorandum consists of 19 pages./
Hierdie memorandum bestaan uit 19 bladsye.

GUIDELINES FOR MARKING/RIGLYNE VIR NASIEN

This section provides guidelines for the way in which marks will be allocated. The broad principles must be adhered to in the marking of Physical Sciences tests and examinations.

Hierdie afdeling verskaf riglyne vir die manier waarop punte toegeken sal word. Die breë beginsels moet tydens die nasien van Fisiese Wetenskappe toetse en eksamens gevolg word.

1.1 MARK ALLOCATION/PUNTEOEKENNING

1.1.1 **Definitions/Definisies:** Two marks will be awarded for a correct definition. No marks will be awarded for an incorrect or partially correct definition. *Twee punte sal vir 'n korrekte definisie toegeken word. Geen punte sal vir 'n verkeerde of gedeeltelik korrekte definisie toegeken word nie.*

1.1.2 **Calculations/Berekeninge:**

- Marks will be awarded for: correct formula, correct substitution, correct answer with unit.
Punte sal toegeken word vir: korrekte formule, korrekte substitusie, korrekte antwoord met eenheid.
- No marks will be awarded if an incorrect or inappropriate formula is used, even though there may be relevant symbols and applicable substitutions.
Geen punte sal toegeken word waar 'n verkeerde of ontoepaslike formule gebruik word nie, selfs al is daar relevante simbole en relevante substitusies.

1.1.3 **Explanations and interpretations/Verduidelikings en interpretasie:**

Allocation of marks to questions requiring interpretation or explanation e.g. AS 1.4, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 and 3.3, will differ and may include the use of rubrics, checklists, memoranda, etc. In all such answers emphasis must be placed on scientific concepts relating to the question.

Toekenning van punte by vrae wat interpretasie of verduideliking vereis bv. AS 1.4, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2 en 3.3, sal verskil en mag die gebruik van rubriek, kontrolelyste, memoranda, ens. insluit. By al hierdie antwoorde moet die beklemtoning op die wetenskaplike konsepte, met betrekking tot die vraag, val.

1.2 FORMULAE AND SUBSTITUTIONS/FORMULES EN SUBSTITUSIE

1.2.1 Mathematical manipulations and change of subjects of appropriate formulae carry no marks, but if a candidate starts with the correct formula and then changes the subject of the formula incorrectly, marks will be awarded for the formula and the correct substitutions. The mark for the incorrect numerical answer is forfeited.

Wiskundige manipulering en verandering van die voorwerp van toepaslike formules dra geen punte nie, maar as 'n kandidaat begin met die korrekte formule en dan die voorwerp van die formule verkeerd uitwerk, sal punte vir die formule en korrekte substitusie toegeken word.

- 1.2.2 When an error is made during **substitution into a correct formula**, a mark will be awarded for the correct formula and for the correct substitutions, but **no further marks** will be given.
*Wanneer 'n fout gedurende **substitusie in 'n korrekte formule** begaan word, sal 'n punt vir die korrekte formule en vir korrekte substitusie toegeken word, maar **geen verdere punte** sal toegeken word nie.*
- 1.2.3 Marks are only awarded for a formula if a calculation had been **attempted**, i.e. substitutions have been made or a numerical answer given.
*Punte sal slegs toegeken word vir 'n formule as 'n **poging aangewend was** om 'n berekening te doen d.w.s. substitusie was gedoen of 'n numerieke antwoord word verskaf.*
- 1.2.4 Marks can only be allocated for substitutions when values are substituted into formulae and not when listed before a calculation starts.
Punte kan slegs toegeken word vir substitusies wanneer waardes in formules ingestel is en nie vir waardes wat voor 'n berekening gelys is nie.
- 1.2.5 All calculations, when not specified in the question, must be done to two decimal places.
Alle berekenings, wanneer nie in die vraag gespesifiseer word nie, moet tot twee desimale plekke gedoen word.

1.3 UNITS/EENHEDE

- 1.3.1 Candidates will only be penalised once for the repeated use of an incorrect unit **within a question or sub-question**.
*'n Kandidaat sal slegs een keer gepenaliseer word vir die herhaalde gebruik van 'n verkeerde eenheid **in 'n vraag of subvraag**.*
- 1.3.2 Units are only required in the final answer to a calculation.
Eenhede word slegs in die finale antwoord tot 'n vraag verlang.
- 1.3.3 Marks are only awarded for an answer, and not for a unit per se. Candidates will therefore forfeit the mark allocated for the answer in each of the following situations:
 - correct answer + wrong unit
 - wrong answer + correct unit
 - correct answer + no unit.*Punte word slegs vir 'n antwoord en vir 'n eenheid per se toegeken nie. Kandidate sal derhalwe die punt vir die antwoord in die volgende gevalle verbeur:*
 - korrekte antwoord + verkeerde eenheid
 - verkeerde antwoord + korrekte eenheid
 - korrekte antwoord + geen eenheid
- 1.3.4 SI units must be used except in certain cases, e.g. $V \cdot m^{-1}$ instead of $N \cdot C^{-1}$, and $cm \cdot s^{-1}$ or $km \cdot h^{-1}$ instead of $m \cdot s^{-1}$ where the question warrants this. (This instruction only applies to Paper 1).
SI-eenhede moet gebruik word behalwe in sekere gevalle, bv. $V \cdot m^{-1}$ inplaas van of $N \cdot C^{-1}$, en $cm \cdot s^{-1}$ of $km \cdot h^{-1}$ inplaas van $m \cdot s^{-1}$ waar die vraag dit verlang. (Hierdie instruksie geld slegs by Vraestel 1).

1.4 POSITIVE MARKING/POSITIEWE NASIEN

Positive marking regarding calculations will be followed in the following cases:
Positiewe nasien met betrekking tot berekening sal in die volgende gevalle geld:

- 1.4.1 **Sub-question to sub-question:** When a certain variable is calculated in one sub-question (e.g. 3.1) and needs to be substituted in another (3.2 or 3.3), e.g. if the answer for 3.1 is incorrect and is substituted correctly in 3.2 or 3.3, **full marks** are to be awarded for the subsequent sub-questions.

Subvraag na subvraag: Wanneer 'n sekere veranderlike in een subvraag (bv. 3.1) bereken word en dan in 'n ander vervang moet word (3.2 of 3.3), bv. Indien die antwoord vir 3.1 verkeerd is en word korrek in 3.2 of 3.3 vervang, word volpunte aan die daaropvolgende subvraag toegeken.

- 1.4.2 **A multi-step question in a sub-question:** If the candidate has to calculate, for example, current in the first step and gets it wrong due to a substitution error, the mark for the substitution and the final answer will be forfeited.

'n Vraag met veelvuldige stappe in 'n subvraag: Indien 'n kandidaat byvoorbeeld, die aantal mol verkeerd bereken in 'n eerste stap as gevolg van 'n substitusiefout, verloor die kandidaat die punt vir die substitusie sowel as die finale antwoord.

- 1.4.3 If a final answer to a calculation is correct, full marks will not automatically be awarded. Markers will always ensure that the correct/ appropriate formula is used and that workings, including substitutions, are correct.
Indien 'n finale antwoord tot 'n berekening korrek is, sal volpunte nie outomaties toegeken word nie. Nasieners sal altyd verseker dat die korrekte toepaslike formule gebruik word en dat bewerkings, insluitende substitusies korrek is.

- 1.4.4 Questions where a series of calculations have to be made (e.g. a circuit diagram question) do not necessarily always have to follow the same order. FULL MARKS will be awarded provided it is a valid solution to the problem. However, any calculation that will not bring the candidate closer to the answer than the original data, will not count any marks.
Vrae waar 'n reeks berekening moet word (bv. 'n stroombaan diagram vraag) hoef nie noodwendig altyd dieselfde orde te volg nie. VOLPUNTE sal toegeken word mits dit 'n geldige oplossing tot die probleem is. Maar, enige berekening wat nie die kandidaat nader aan die antwoord bring as die oorspronklike data, sal geen punte tel nie.

- 1.4.5 If one answer or calculation is required, but two given by the candidate, only the first one will be marked, irrespective of which one is correct. If two answers are required, only the first two will be marked, etc.
- Indien een antwoord of berekening verlang word, maar twee word deur die kandidaat gegee, sal slegs die eerste een nagesien word, ongeag watter een korrek is. Indien twee antwoorde verlang word, sal slegs die eerste twee nagesien word, ens.*
- 1.4.6 Normally, if based on a conceptual mistake, an incorrect answer cannot be correctly motivated. If the candidate is therefore required to motivate in question 3.2 the answer given to question 3.1, and 3.1 is incorrect, no marks can be awarded for question 3.2. However, if the answer for e.g. 3.1 is based on a calculation, the motivation for the incorrect answer for 3.2 could be considered.
- Normaalweg, as dit gebaseer is op 'n voorstellingsfout, kan 'n verkeerde antwoord nie korrek gemotiveer word nie. As die kandidaat derhalwe gevra word met 'n vraag in 3.2 om die antwoord in vraag 3.1 te motiveer, en 3.1 is verkeerd, sal geen punte vir vraag 3.2 toegeken word nie. Maar, as die antwoord in bv. 3.1 gebaseer is op 'n berekening, kan die motivering vir die verkeerde antwoord oorweeg word.*
- 1.4.7 If instructions regarding method of answering are not followed, e.g. the candidate does a calculation when the instruction was to **solve by construction and measurement**, a candidate may forfeit all the marks for the specific question.
- Indien instruksies aangaande metode van beantwoording nie gevolg word nie, bv. die kandidaat doen 'n berekening wanneer die instruksie **los op deur konstruksie en meting** was, mag die kandidaat al die punte vir die spesifieke vraag verbeur.*
- 1.4.8 For an **error of principle, no marks** are awarded (Rule 1) e.g. If the potential difference is 200 V and resistance is 25 Ω , calculate the current.
- Vir 'n **foutdraendebeginsel**, sal **geen punte** toegeken word nie (Reël 1) bv. As die potensiaalverskil 200 V en die weerstand 25 Ω is, bereken die stroom.*

CORRECT KORREK	ANSWER (1) ANTW. (1)	POSSIBLE MOONTLIK	ANSWER (2) ANTW. (2)	POSSIBLE MOONTLIK
$I = \frac{V}{R}$ $= \frac{200}{25}$ $= 8A \checkmark$	$R = \frac{V}{I} \checkmark$ $= \frac{200}{25} x$ $= 8A x$	$R = \frac{V}{I} x$ $= \frac{200}{25} x$ $= 8A$	$R = \frac{V}{I} \checkmark$ $I = \frac{R}{V} x$ $= \frac{25}{200}$ $= 0,125 A x$	$I = \frac{V}{R} \checkmark$ $= 8A \checkmark$

1.5 GENERAL PRINCIPLES OF MARKING IN CHEMISTRY/ ALGEMENE BEGINSELS VAN NASIEN BY CHEMIE

The following are a number of guidelines that specifically apply to Paper 2.
Die volgende is 'n aantal riglyne wat spesifiek op Vraestel 2 van toepassing is.


- 1.5.1 When a chemical **FORMULA** is asked, and the **NAME** is given as answer, only one of the two marks will be awarded. The same rule applies when the **NAME** is asked and the **FORMULA** is given.
Wanneer 'n chemiese FORMULE gevra word en die NAAM word as antwoord gegee, sal slegs een van die twee punte toegeken word.
Dieselde reël geld wanneer die NAAM gevra word en die FORMULE gegee word.

- 1.5.2 When redox half-reactions are to be written, the correct arrow should be used. If the equation

$$\text{H}_2\text{S} \rightarrow \text{S} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \quad (2/2)$$

is the correct answer, the following marks will be given:

Wanneer redokshalfreaksies geskryf moet word, moet die korrekte pyltjie gebruik word. Indien die bostaande vergelyking die korrekte antwoord is, sal die volgende punte toegeken word:



- 1.5.3 When candidates are required to give an explanation involving the relative strength of oxidising and reducing agents, the following is unacceptable:
- Stating the position of a substance on Table 4 only (e.g. Cu is above Mg).
 - Using relative reactivity only (e.g. Mg is more reactive than Cu).
 - The correct answer would for instance be: Mg is a stronger reducing agent than Cu, and therefore Mg will be able to reduce Cu^{2+} ions to Cu. The answer can also be given in terms of the relative strength as electron acceptors and donors.

Wanneer kandidate 'n verduideliking moet gee oor die relatiewe sterkte van oksideer- en reduseermiddels, is die volgende onaanvaarbaar.

- *Meld slegs die posisie van 'n stof op tabel 4 (bv. Cu is bo Mg).*
- *Gebruik slegs relatiewe reaktiwiteit (bv. Mg is meer reaktief as Cu).*
- *Die korrekte antwoord sal byvoorbeeld wees: Mg is 'n sterker reduseermiddel as Cu en derhalwe sal Mg in staat wees om Cu^{2+} -ione na Cu te reduseer. Die antwoord kan ook in terme van die relatiewe sterkte van elektronakseptors of donors gegee word.*

- 1.5.4 One mark will be forfeited when the charge of an ion is omitted per equation.
Een punt sal verbeur word wanneer die lading van 'n ioon per vergelyking weggelaat is.
- 1.5.5 The error carrying principle does not apply to chemical equations or half-reactions. For example, if a learner writes the wrong oxidation/reduction half-reaction in the sub-question and carries the answer to another sub-question (balancing of equations or calculations of E^θ_{cell}) then the learner is not credited for this substitution.
Die foutdraendebeginsel geld nie vir chemiese vergelykings of halfreaksies nie. Byvoorbeeld, indien 'n leerder die verkeerde oksidasie/reduksie-halfreaksie vir die subvraag skryf en die antwoord na 'n ander subvraag dra (balansering van vergelyking of E^θ_{sel}) dan word die leerder nie vir die substitusie gekrediteer nie.
- 1.5.6 When a calculation of the cell potential of a galvanic cell is expected, marks will only be awarded for the formula if one of the formulae indicated on the data sheet (Table 2) is used. The use of any other formula using abbreviations etc. will carry no marks.
Wanneer 'n berekening van die selpotensiaal van 'n galvaniese sel verlang word, sal punte slegs vir die formule toegeken word as een van die formules op die gegewensblad (Tabel 2) gebruik word. Die gebruik van enige ander formule, die gebruik van afkortings, ens. Sal geen punte dra nie.
- 1.5.7 In the structural formula of an organic molecule all hydrogen atoms must be shown. Marks will be deducted if hydrogen atoms are omitted.
In die struktuurformules van 'n organiese molekuul moet alle waterstofatome getoon word. Punte sal afgetrek word vir die weglatting van waterstofatome.
- 1.5.8 When a structural formula is asked, marks will be deducted if the candidate writes the condensed formula.
Wanneer 'n struktuurformule gevra word, sal punte afgetrek word indien die leerder die gekondenseerde formule skryf.
- 1.5.9 When an IUPAC name is asked, and the candidate omits the hyphen (e.g. instead of 1-pentene the candidate writes 1 pentene), marks will be forfeited.
Wanneer die IUPAC naam gevra word en die koppelteken(s) in die naam word uitgelaat (bv. In plaas van pent-1-een of 1-penteen skryf 'n kandidaat pent 1 een of 1 penteen), sal punte verbeur word.

QUESTION/VRAAG 1

- 1.1 C ✓✓
 1.2 A ✓✓
 1.3 C ✓✓
 1.4 B ✓✓
 1.5 A ✓✓
 1.6 D ✓✓
 1.7 A ✓✓
 1.8 C ✓✓
 1.9 A ✓✓
 1.10 B ✓✓

(10 x 2) [20]

QUESTION/VRAAG 2

2.1 2.1.1 G ✓

(1)

2.1.2 F ✓

(1)

2.2 2.2.1 C_nH_{2n+2} ✓

(1)

2.2.2 Carboxylic group ✓ / Karboksiel-groep

(1)

2.2.3 CH_2 ✓

(1)

2.3 2.3.1 4-bromo-3-methylheptane
4-broom-3-metielheptaan**Marking criteria/ Nasienriglyne:**

- Stem i.e. heptane./Stam d.i heptaan. ✓
- Bromo and methyl/Broom en metiel ✓
- Substituents correctly numbered, hyphens, commas and sequence correctly used. ✓

Substituente korrek genommer, koppeltekens en kommas korrek gebruik.

(3)

2.3.2 pentan-3-one ✓✓ / pentan-3-oon

Accept/Aanvaar: 3-pentanone/3-pentanoon**IF/INDIEN:**


pentanone / pentanoon (1/2)

(2)

2.3.3 methyl ✓ methanoate ✓ / metiel metanoaat

(2)

2.4

**Marking criteria/ Nasienriglyne:**

Whole structure correct/Hele struktuur korrek. (2/2)

TWO methyl groups/TWEE metiel-groepe (1/2)


(2)

2.5

2.5.1 Sulphuric acid/ H_2SO_4 ✓
Swawelsuur/ H_2SO_4

(1)

2.5.2

**Marking criteria/ Nasienriglyne:**

Whole structure correct/Hele struktuur korrek. (2/2)

Functional group correct/Funksionele groep korrek (1/2)


Notes/Aantekeninge:Condensed structural formula or semi structural formula/
Gekondenseerde formule of semi-struktuurformule (1/2)

(2)

2.5.3 Flammable/Volatile ✓
Vlambaar/Vlugtig

(1)

2.6

**Marking criteria/ Nasienriglyne:**

Whole structure correct/Hele struktuur korrek.

Functional group correct/Funksionele groep korrek (2/2)

Notes/Aantekeninge:

Condensed structural formula or semi structural formula/

Gekondenseerde formule of semi-struktuurformule (1/2)

2-methyl ✓ propan-2-ol✓

2-metiel propan-2-ol

Accept/Aanvaar: 2-methyl-2-propanol/2-metiel-2-propanol**Marking criteria/ Nasienriglyne**

2-methyl/2-metiel

Propan-2-ol

(2)

2.7

CO₂, ✓ H₂O ✓

(2)

[24]

QUESTION/VRAAG 3

- 3.1 The temperature at which the vapour pressure equals the atmospheric (external) pressure. ✓✓
Die temperatuur waar die dampdruk gelyk aan die atmosferiese (eksterne) druk is. (2 or/of 0) (2)
- 3.2.1 Chain length/surface area/molecular size(mass)/number of C atoms. ✓
Kettinglengte/oppervlaks area/molekulêre grootte (massa)/ aantal C atome. (1)
- 3.2.2 Thermometer ✓/Termometer (1)

- 3.3  C/ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ ✓ (1)

3.4 **From A to C**

- Chain length/surface area/molecular size/molecular mass/number of C's in the chain increases. ✓
- Strength of intermolecular forces/London forces/induced dipole/dispersion forces increases. ✓
- More energy needed to overcome/break intermolecular forces. ✓

Van A na C

- Kettinglengte/oppervlaksarea/molekulêre grootte/molekulêre massa/aantal C's in ketting neem toe.
- Sterkte van intermolekulêre kragte/London kragte/geïnduseerde dipole/dispersie kragte vermeerder.
- Meer energie benodig om intermolekulêre kragte te oorkom/breek.

From C to A

- The chain length/surface area/molecular size/molecular mass/number of C's in the chain decreases. ✓
- Strength of intermolecular forces/London forces/induced dipole/dispersion forces decreases. ✓
- Less energy needed to overcome/break intermolecular forces.

Van C na A

- Kettinglengte/oppervlaksarea/molekulêre grootte/molekulêre massa/aantal C's in ketting neem af.
- Sterkte van intermolekulêre kragte/London kragte/geïnduseerde dipole/dispersie kragte verminder.
- Minder energie benodig om intermolekulêre kragte te oorkom/breek. (3)

- 3.5 3.5.1 A series of organic compounds with the same general formula. ✓✓
 OR in which one member differs from the next with a CH₂ group.
 'n Reeks organiese verbindings met dieselfde algemene formule OF
 waarin EEN lid van die volgende met 'n CH₂ groep verskil. (2 or/of 0) (2)

- 3.5.2 Between molecules of **D** there are hydrogen bonds. ✓
 Between molecules of **E** there are dipole-dipole forces. ✓.
 Hydrogen bonds are stronger than dipole-dipole forces. ✓
More energy needed to overcome/break intermolecular forces in D. ✓

*Tussen molekules van **D** is daar waterstofbindings.*

*Tussen molekules van **E** is daar dipool-dipool kragte.*

Waterstofbindings is sterker as dipool-dipoolkragte.

*Meer energie benodig om intermolekulêre kragte te oorkom/breek in **D**.*

OR/OF

- Between molecules of **D** there are hydrogen bonds. ✓
 Between molecules of **E** there are dipole-dipole forces. ✓
 Dipole-dipole forces are weaker than hydrogen bonds. ✓
Less energy needed to overcome/break intermolecular forces in **E**. ✓

*Tussen molekules van **D** is daar waterstofbindings.*

*Tussen molekules van **E** is daar dipool-dipool kragte.*

Dipool-dipoolkragte is swakker as waterstofbindings.

*Minder energie benodig om intermolekulêre kragte te oorkom/breek in **E**.*

(4)

- 3.5.3 **E** ✓
 Higher boiling point ✓/Hoër kookpunt


(2)

[16]

QUESTION/VRAAG 4

- 4.1 4.1.1 (a) Substitution/halogenation/bromination. ✓
Substitusie/halogenasie/halogenering/bromering (1)
- 4.1.2 Elimination/dehydrohalogenation ✓
Eliminasie/dehalogenasie/dehidrogenering (1)
- 4.2 4.2.1 Bromine/Br₂ ✓
Bromied/Br₂ (1)
- 4.2.2 Heat/Ultraviolet ✓
Hitte/Ultraviolet-lig (1)
- 4.2.3 Butane/Butaan ✓✓ (2)

4.3




(2)

Marking criteria/ Nasienriglyne:

Whole structure/Hele struktuur (2/2)

Only functional group correct/Slegs funksionele groep korrek. (1/2)

4.4



(2)

Marking criteria/ Nasienriglyne:

Whole structure/Hele struktuur (2/2)

Only functional group correct/Slegs funksionele groep korrek. (1/2)

4.5 Dilute KOH ✓ and mild heat ✓
Verdunde KOH en matige hitte

(2)

[12]

QUESTION/VRAAG 5

5.1 The change in concentration/mass/number (amount) of moles/volume ✓ of reactants or products per unit time. ✓

Die verandering in konsentrasie ✓/massa/aantal (hoeveelheid) mol/volume van reaktanse of produkte per eenheidstyd. ✓

(2)

5.2 Experiment/Ekspirement 1 ✓

- Highest temperature ✓/ Hoogste temperatuur
- Largest surface area ✓/ Grootste oppervlaksarea

(3)

5.3 5.3.1 Temperature✓/Surface area/State of division.
Temperatuur/Oppervlak-area

(1)

5.3.2 Equal to ✓/Gelyk aan

Number/amount of mol/mass of Mg used is the same. ✓
Hoeveelheid/aantal mol/massa van Mg gebruik is dieselfde.

(2)

- 5.4 More than ONE independent variable. ✓
Meer as EEN onafhanklike veranderlike.

(1)

5.5 **Marking criteria/ Nasienriglyne:**

- * Formula/Formule : $n = cV$ ✓
- * Substitution into/Vervanging in: $n = cV$ ✓
- * Divide by 24 /Deel deur 24 ✓
- * Use of ratio/Gebruik verhoudings.: $n(\text{HCl}) = 2n(\text{Mg})$ ✓
- * $n(\text{HCl})$ remaining = $n(\text{HCl})_{\text{initial}} - n(\text{HCl})_{\text{reacting}}$ $n(\text{HCl})$ ✓
 $n(\text{HCl})$ oorgebly = $n(\text{HCl})_{\text{aanvanklik}} - n(\text{HCl})_{\text{gereageer}}$
- * Substitution of 36,5 into $n = m/M$ ✓
 Vervanging van 36,5 in $n = m/M$
- * Final answer/Finale antwoord. ✓

$$\begin{aligned} n(\text{HCl})_{\text{initial/aanvanklik}} &= cV \quad \checkmark \\ &= 2 \times 80/1\ 000 \quad \checkmark = 0,16 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} n(\text{Mg})_{\text{reacting/gereageer}} &= m/M \\ &= 0.24/24 \quad \checkmark \\ &= 0.01 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$n(\text{HCl})_{\text{reacting/gereageer}} = 2 \times 0.01 \quad \checkmark = 0.02 \text{ mol}$$

$$n(\text{HCl})_{\text{remaining/oorgebly}} = 0.16 - 0.02 \quad \checkmark = 0.14 \text{ mol}$$

$$m(\text{HCl})_{\text{remaining/oorgebly}} = nM = 0.14 \times 36,5 \quad \checkmark = 5,11 \text{ g} \quad (7)$$

- 5.6 5.6.1 Number/Fraction of molecules/particles ✓
Aantal/Gedeelte van molekules/deeltjies

(1)

- 5.6.2 P ✓

(1)

- 5.6.3 Increase in temperature/*Toename in temperatuur*

- Increases (average) kinetic energy of particles. ✓
Toename in (gemiddelde) kinetiese energie van deeltjies.
- More particles have enough/sufficient (kinetic) energy to react.
 $E_k \geq E_a$
Meer deeltjies het genoegsame (kinetiese) energie om te reageer./ $E_k \geq E_a$
- More effective collisions per unit time/second. ✓
Meer effektiewe botsings per eenheidstyd/sekonde.

OR/OF

Rate/Frequency of effective collisions increases. ✓
Tempo/Frekwensie van effektiewe botsings neem toe.

- Increases reaction rate ✓
Toename in reaksie-tempo.

(4)

[22]

QUESTION/VRAAG 6

- 6.1 The stage in a chemical reaction when the rate of the forward reaction is equal to the rate of the reverse reaction. ✓✓

Die stadium in 'n chemiese reaksie wanneer die tempo van die voortwaartse reaksie gelyk aan die tempo van die terugwaartse reaksie is. (2 or/of 0) (2)

- 6.2 6.2.1 Increases ✓ / Toeneem (1)

- 6.2.2 Decreases ✓ / Afneem



(1)

- 6.3 Change is opposed/Increase in pressure is opposed/The reaction that will oppose this increase in pressure/decrease the pressure will be favoured. ✓
Verandering is teengewerk/Toename in druk is teengewerk/Die reaksie wat hierdie toename in druk teenwerk/laat afneem sal bevoordeel word.

Increase in pressure favours the reaction which produces less gas moles/volume. ✓


Toename in druk bevoordeel die reaksie wat minder mol/volume gas produseer.

The reverse reaction is favoured. ✓

Die terugwaartse reaksie word bevoordeel.

(3)

- 6.4

**Notes/Aantekeninge:**

- Curves starts at same concentration and intercept at the same final concentration. ✓
Kurwes begin by dieselfde konsentrasie en sny af by dieselfde finale konsentrasie.
- Broken line on graph is below solid line and levels off faster than the solid line. ✓
Stippellyn op grafiek is onder vastelyn en neem vinniger af as vastelyn.

(2)

6.5 6.5.1 $T = 23^\circ\text{C}$ ✓



Largest K_c value. ✓ / Grootste K_c waarde.

(2)

6.5.2

Marking criteria/ Nasienriglyne:

- Correct K_c expression (formulae in square brackets). ✓
Korrekte K_c uitdrukking (formules in vierkantbakies)
- Substitution of 0,32 for K_c value. ✓
Vervanging van 0,32 as K_c waarde.
- Substitute 0,5 as $[N_2O_4]$ /Vervang 0,5 as $[N_2O_4]$ ✓
- $[NO_2]$ equilibrium/ $[NO_2]$ by ewewig ✓
- Change in concentration of NO_2 /Verandering in konsentrasie van NO_2 ✓
- Using ratio/Gebruik verhouding: $N_2O_4 : NO_2 = 1:2$ ✓
- Initial $[N_2O_4] =$ Equilibrium $[N_2O_4] +$ Change in $[N_2O_4]$ ✓
Aanvanklike $[N_2O_4] =$ Ewewig $[N_2O_4] +$ Verandering in $[N_2O_4]$

$$K_c = [NO_2]^2/[N_2O_4] \checkmark$$

$$0,32 \checkmark = [NO_2]^2/0,5 \checkmark$$

$$[NO_2] = 0,4 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$$

	N_2O_4	NO_2
Initial concentration (mol.dm ⁻³) <i>Aanvangskonsentrasie (mol.dm⁻³)</i>	✓ 0,7	0
Change in concentration (mol.dm ⁻³) <i>Verandering in konsentrasie (mol.dm⁻³)</i>	0,2	0,4 ✓
Equilibrium concentration (mol.dm ⁻³) <i>Ewewigkonsentrasie (mol.dm⁻³)</i>	0,5	0,4 ✓

Ratio ✓
Verhouding

(7)

6.5.3 Exothermic. ✓ / Eksotermies



When temperature increases, K_c decreases ✓ therefore [products] decreases.

Wanneer die temperatuur toeneem, sal K_c toeneem daarom neem [produkte] af.

Reverse reaction is favoured. ✓

Terugwaartse reaksie word bevordeel.

Increase in temperature favours the endothermic reaction (reverse reaction). ✓

Toename in temperatuur bevordeel endotermiese reaksie (terugwaartse reaksie.)

(4)

[22]

QUESTION/VRAAG 7

7.1 7.1.1 An acid that donates one proton (H^+) ✓ per molecule.
 'n *Suur wat een proton (H^+) per molekuul sken.* (2)

7.1.2 CH_3COO^- ✓ (1)

7.1.3 Weak acid ✓/Swak suur



Low K_a value ✓/Lae K_a waarde (2)

7.2 7.2.1	OPTION/OPSIE 1 $K_w = [OH^-][H_3O^+]$ $10^{-14} = 1 \times 10^{-5} [H_3O^+]$ ✓ $[H_3O^+] = 10^{-9}$ mol.dm $^{-3}$	OPTION/OPSIE 2 $pOH = -\log [OH^-]$ ✓ $= -\log(1 \times 10^{-5})$ ✓ $= 5$
	$pH = -\log [H_3O^+]$ ✓ $= -\log 10^{-9}$ ✓ $= 9$ ✓	$14 = pH + pOH$ $14 = pH + 5$ ✓ $pH = 9$ ✓

7.2.2 $c_1V_1 = c_2V_2$
 $(1 \times 10^{-5})(10)$ ✓ = $(1 \times 10^{-6})V_2$ ✓
 $V_2 = 100$ cm $^{-3}$ ✓ (3)

7.3 7.3.1 $n = cV$ ✓
 $= (0,8(100/1 000))$ ✓
 $= 0,08$ ✓ (mol) (3)

7.3.2

Marking criteria/Nasienriglyne:

- $n(KOH) = cV$ ✓
- Substitution of c and V to find $n(KOH)$ ✓
- *Substitusie van c en V om n(KOH) te bereken.*
- Use MOL RATIO/Gebruik MOLVERHOUDING: $n(H_2SO_4) : n(KOH) = 1 : 2$ ✓
- $n(H_2SO_4)_{reacted/gereageer} = n(H_2SO_4)_{initial/aanvanklik} - n(H_2SO_4)_{excess/oormaat}$ ✓
- Use MOL RATIO/Gebruik MOLVERHOUDING: $n(H_2SO_4) : n(Na_2CO_3) = 1 : 1$ ✓
- Substitution into $m = nM$ to calculate $m(Na_2CO_3)$ ✓
Substitusie in m = nM om m(Na₂CO₃) te bereken.
- Final answer/Finale antwoord: 7.92 g/ 7.95 g ✓



**POSITIVE MARKING from QUESTION 7.3.1
POSITIEWE NASIEN vanaf VRAAG 7.3.1**

$$n(\text{KOH}) = cV \checkmark = (0,3)(0,035) \checkmark = 0,01 \text{ mol}$$




$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = 1/2n(\text{KOH}) = 0,5(0,01) \checkmark = 0,005 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4)_{\text{reacted/gereageer}} = 0,08 - 0,005 \checkmark = 0,075 \text{ mol}$$

$$n(\text{Na}_2\text{CO}_3) = n(\text{H}_2\text{SO}_4)_{\text{reacted/gereageer}} = 0,075 \text{ mol} \checkmark$$

$$m(\text{Na}_2\text{CO}_3) = nM = (0,075)(106) \checkmark = 7,95 \text{ g} \checkmark$$

(8)



Accept/Aanvaar: Single arrow/*Enkel pyltjie*

Marking guidelines/ Merkgriglyne:

- | | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| • Reactants \checkmark | Products \checkmark | Balancing \checkmark |
| Reaktanse | Produkte | Balansering |
| • Marking rule 6.3.10/Nasienreël 6.3.10 | | |

(3)

[26]

QUESTION/VRAAG 8

- 8.1 8.1.1 Percentage yield decreases as the temperature increases. ✓
Persentasie opbrengs neem af soos die temperatuur toeneem.

OR/OF

Percentage yield increases as the temperature decreases. ✓
Persentasie opbrengs neem toe soos die temperatuur afneem. (2)

- 8.1.2 50 ✓ (%) (1)

- 8.1.3 200 ✓ (atmosphere/atmosfeer) (1)

8.2 $n(N_2) = m/M = 112/28 \checkmark = 4 \text{ mol}$

$n(NH_3) = 2n(N_2) = 2(4) \checkmark = 8 \text{ mol}$

% Yield = Actual yield/Theoretical yield x 100

% Opbrengs = Werklike opbrengs/Teoretiese opbrengs x 100

60 = Actual yield/Werklike opbrengs x 100/8

Actual yield/Werklike opbrengs = 4,8 mol ✓

(4)

[8]

TOTAL/TOTAAL: 150