



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NASIONALE  
SENIOR SERTIFIKAAT**

**GRAAD 11**

**NOVEMBER 2020**

**FISIESE WETENSKAPPE V2  
(CHEMIE)  
(EKSEMPLAAR)**

**PUNTE:** 150

**TYD:** 3 uur

---

Hierdie vraestel bestaan uit 18 bladsye, insluitend 4 gegewensbladsye.

---

**INSTRUKSIES EN INLIGTING**

1. Skryf jou volle NAAM en VAN in die toepaslike spasies in die ANTWOORDEBOEK.
2. Hierdie vraestel bestaan uit TIEN vrae. Beantwoord AL die vrae in die ANTWOORDEBOEK.
3. Begin ELKE vraag op 'n NUWE bladsy in die ANTWOORDEBOEK.
4. Nommer die antwoorde korrek volgens die nommeringstelsel wat in hierdie vraestel gebruik word.
5. Laat EEN reël oop tussen twee subvrae, byvoorbeeld tussen VRAAG 2.1 en VRAAG 2.2.
6. Jy mag 'n nieprogrammeerbare sakrekenaar gebruik.
7. Jy mag toepaslike wiskundige instrumente gebruik.
8. Toon ALLE formules en vervangings in ALLE berekening.
9. Rond jou FINALE numeriese antwoorde tot 'n minimum van TWEE desimale plekke af.
10. Gee kort (bondige) motiverings, besprekings, ensovoorts waar nodig.
11. Jy word aangeraai om die aangehegte GEGEWENSBLAAIE te gebruik.
12. Skryf netjies en leesbaar.

**VRAAG 1: MEERVOUDIGEKEUSE-VRAE**

Verskeie opsies word as moontlike antwoorde vir die volgende vrae gegee. Kies die antwoord en skryf slegs die letter (A–D) langs die vraagnommers (1.1–1.10) in die ANTWOORDEBOEK neer, byvoorbeeld 1.11 D.

1.1 Die afstand tussen die kerne van twee aangrensende atome wanneer atome bind, word ... genoem.

- A verbindingsslengte
- B verbindingsergie
- C interatomiese binding
- D intermolekulêrekragte

(2)

1.2 Watter EEN van die volgende stowwe het ION-DIPOOL kragte?

- A  $\text{H}_2\text{O}$  ( $l$ )
- B  $\text{CO}_2$  (g)
- C  $\text{NaCl}$  (aq)
- D  $\text{NaCl}$  (s)

(2)

1.3 Die geometriese vorm van die molekuul  $\text{PCl}_5$  volgens die VSEPA-teorie is ...

- A lineêr.
- B trigonaal-planer.
- C tetraëdraal.
- D trigonaal-piramidaal.

(2)

1.4 EEN mol van water ( $\text{H}_2\text{O}$ ) en EEN mol koolstofdioksied ( $\text{CO}_2$ ) het dieselfde ...

- A massa.
- B molêre massa.
- C aantal molekules.
- D digtheid.


(2)

- 1.5 Suurstof met 'n sekere massa word in 'n spuit verseël. Die gas oefen 'n druk van  $p$  uit. As beide die volume en die temperatuur verdubbel word, sal die nuwe druk van die gas ... word.

- A  $p$   
 B  $\frac{1}{2} p$   
 C  $2 p$   
 D  $4 p$

(2)

- 1.6 Die verhouding tussen druk en volume van 'n vaste hoeveelheid gas by konstante temperatuur word die BESTE beskryf deur ...



- 1.7 Gelyke massas van elk van die volgende gasse, He, O<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> en N<sub>2</sub> word in aparte houers by dieselfde temperatuur en druk geplaas.

Watter EEN van die gasse het die GROOTSTE volume?

- A He  
 B O<sub>2</sub>  
 C CH<sub>4</sub>  
 D N<sub>2</sub>

(2)

1.8 Beskou die reaksie:



X verteenwoordig ...


- A  $\text{H}_2\text{O}$  wat as 'n suur optree.
- B  $\text{H}_2\text{O}$  wat as 'n basis optree.
- C  $\text{H}_3\text{O}^+$  wat as 'n suur optree.
- D  $\text{H}_3\text{O}^+$  wat as 'n basis optree. (2)

1.9 Beskou die onderstaande reaktantpare.

Watter EEN van die volgende reaktant pare sal sout, water en koolstofdioksied produseer?

- A  $\text{Zn} + \text{H}_2\text{SO}_4$
- B  $\text{NaOH} + \text{HCl}$
- C  $\text{CuO} + \text{H}_2\text{SO}_4$
- D  $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl}$  (2)

1.10 Beskou die volgende redoksreaksie:




Die produk van die reduksie-halfreaksie in die vergelyking is ...

- A  $\text{Fe}^{3+}$ .
  - B  $\text{Cr}^{3+}$ .
  - C  $\text{H}_2\text{O}$ .
  - D  $\text{H}^+$ . (2)
- [20]

**VRAAG 2 (Begin op 'n NUWE bladsy.)**

Beskou die volgende chemiese vergelykings:



2.1 Definieer die term *kovalentebinding*. (2)

2.2 Skryf die Lewis-struktuur vir die  $\text{CH}_4$ -molekuul neer. (2)

2.3 Beskou die C – H en O – H bindings.

Watter binding ...

2.3.1 het die langer bindingslengte? Gee 'n rede vir jou antwoord. (2)

2.3.2 is sterker? (1)

2.4 Hoeveel alleenpare is in die sentrale atoom van die  $\text{H}_2\text{O}$ -molekuul? (1)

2.5 Skryf die formule van 'n stof in reaksie II wat 'n datiewe kovalentebinding het neer. (1)

2.6 Die  $\text{NH}_3$ -molekuul is POLÊR maar die  $\text{CH}_4$ -molekuul is NIE-POLÊR.


Verduidelik hierdie waarneming. (4)

[13]

**VRAAG 3 (Begin op 'n NUWE bladsy.)**

- 3.1 Die kookpunte in die onderstaande tabel is verkry tydens 'n ondersoek om die kookpunte van groep 7 haliede te vergelyk. Die haliede,  $\text{HCl}$  en  $\text{HBr}$ , word in die tabel as verbindings **A** en **B** onderskeidelik gemerk.


Verbinding	Molekulêre massa ( $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ )	Kookpunt ( $^{\circ}\text{C}$ )
<b>A</b> $\text{HCl}$	36,6	- 85
<b>B</b> $\text{HBr}$	81	- 66

- 3.1.1 Definieer die term *kookpunt*. (2)
- 3.1.2 In watter fases is die verbindings (**A** en **B**) by  $0^{\circ}\text{C}$  en  $101\text{ kPa}$  by eksterne druk? (1)
- 3.1.3 Noem die tipe intermolekulêre krag wat bestaan tussen molekules van beide verbindings **A** en **B** as gevolg van die polêre aard van hierdie molekules. (1)
- 3.1.4 Watter EEN van die verbindings (**A** of **B**) het STERKER Londenkragte (verspreidingskragte)?  
Gee 'n rede vir jou antwoord. (3)
- 3.1.5 Watter verbinding (**A** of **B**), sal die hoogste dampdruk hê?  
Gee 'n rede vir die antwoord deur na die data in die tabel te verwys. (2)
- Verbinding **C** ( $\text{HF}$ ), nie in die tabel getoon nie, het 'n kleiner molekulêre groote as beide verbindings **A** en **B**, maar het 'n relatiewe hoër kookpunt van  $19,5^{\circ}\text{C}$ .
- 3.1.6 Verduidelik waarom die kookpunt van verbinding **C** HOËR is as dié van verbindings **A** en **B** deur na die TIPE en STERKTE van die betrokke intermolekulêre kragte te verwys. (3)
- 3.2 Vaste jodium ( $\text{I}_2$ ) word by gelyke volumes koolstofftetrachloried ( $\text{CCl}_4$ ) en water bygevoeg in aparte proefbuise soos in die onderstaande diagram aangedui.
- 
- 3.2.1 In watter vloeistof ( $\text{CCl}_4$  of  $\text{H}_2\text{O}$ ), sal die jodium oplos? (1)
- 3.2.2 Verduidelik die antwoord op VRAAG 3.2.1 hierbo deur na die intermolekulêre kragte wat betrokke is te verwys. (3)


[16]

#### VRAAG 4 (Begin op 'n NUWE bladsy.)

Graad 11-leerders wil die verhouding tussen temperatuur en volume van 'n gas verifieer. Hulle het die volgende eksperimentele opstelling gebruik.



- 4.1 Skryf die naam van die gas wet wat ondersoek word neer. (1)
- 4.2 Vir hierdie ondersoek skryf neer die:
  - 4.2.1 Ondersoekende vraag (2)
  - 4.2.2 Beheerde veranderlike (1)
- 4.3 Skryf die naam van apparaat X neer. (1)
- 4.4 Die leerders gebruik die resultate van hul ondersoek om die onderstaande grafiek te teken:



- 4.4.1 Bepaal, deur berekening, die waarde van X.  
132 g van CO<sub>2</sub>-gas is in bogenoemde ondersoek gebruik. (4)
- 4.4.2 Bereken die druk van die gas by 269 K. (5)

4.5 Skryf die TWEE toestande van temperatuur en druk neer waarteen werklike gasse van die ideale gasgedrag afwyk. (2)

4.6 Die CO<sub>2</sub> wat in die ondersoek gebruik is, word met 'n gelyke hoeveelheid H<sub>2</sub> (g) vervang.

Watter gas (CO<sub>2</sub> of H<sub>2</sub>) tree meer soos 'n ideale gas op?

Gee TWEE redes vir die antwoord.

(3)

[19]

**VRAAG 5 (Begin op 'n NUWE bladsy.)**

Leerders bestudeer ENDOTERMIESE en EKSOTERMIESE reaksies deur eksperimente **I** en **II** uit te voer waarin die reaksies in die onderstaande tabel plaasvind.

EKSPERIMENT	GEBALANSEERDE VERGELYKING
I	$2 \text{ H}_2\text{O}_2 (\ell) \rightarrow 2 \text{ H}_2\text{O} (\ell) + \text{ O}_2 (\text{g})$
II	$2 \text{ H}_2\text{O} (\ell) \rightarrow 2 \text{ H}_2 (\text{g}) + \text{ O}_2 (\text{g})$

Die leerders het die begin en finale temperature van die reaksiemengsels gemeet. Hulle verkry ook aktiveringsenergieë vir die reaksies uit 'n datatabel.

Die leerders het hul bevindings in 'n tabel voorgestel soos hieronder getoon.

EKSPERIMENT	Begin ( $^{\circ}\text{C}$ )	Finaal ( $^{\circ}\text{C}$ )	Aktiverings-energie (kJ/mol)
I	24	36	75
II	24	18	237

- 5.1 Definieer die term *aktiveringsenergie*. (2)
- 5.2 In watter eksperiment (**I** of **II**) is die reaksie EKSOTERMIES? Verduidelik jou antwoord. (2)
- 5.3 Is die hitte van die reaksie,  $\Delta H$ , POSITIEF of NEGATIEF vir 'n EKSOTERMIESE reaksie? (1)
- 5.4 Skryf die algemene naam neer van 'n stof wat in eksperiment **II** by die reaksiemengsel bygevoeg kan word om die aktiveringsenergie te verminder. (1)
- 5.5 Beide reaksies lewer dieselfde aantal mol suurstofgas op.

Hoe vergelyk die massa  $\text{H}_2\text{O}_2$  wat in eksperiment **I** gebruik is met die massa  $\text{H}_2\text{O}$  wat in eksperiment **II** gebruik is?

Skryf slegs KLEINER AS, GROTER AS of DIESELFDE neer. (2)

- 5.6 Teken 'n potensiële energie teenoor tyd grafiek vir die reaksie in eksperiment II.

Die volgende moet op die grafiek getoon word.

- Hitte van die reaksie ( $\Delta H$ )
- Aktiveringsenergie ( $E_a$ )

(3)

[11]

### VRAAG 6 (Begin op 'n NUWE bladsy.)

- 6.1 Metielpropanoaat is 'n organiese verbinding met die volgende persentasie samestelling:

$$54,55\% \text{ C ; } 9,09\% \text{ H ; } 36,36\% \text{ O}$$

Die molêre massa van die verbinding is  $88 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$ .

6.1.1 Definieer die term *empiriese formule*. (2)

6.1.2 Bepaal, deur berekeninge, die empiriese formule. (6)

6.1.3 Bepaal die molekulêre formule. (2)

- 6.2 Leerders berei 'n oplossing van natriumhidroksied ( $\text{NaOH}$ ) in water voor deur 8 g natriumhidroksied ( $\text{NaOH}$ ) in 'n volumetriese fles te plaas en water by te voeg om  $250 \text{ cm}^3$  oplossing te kry nadat dit geroer is.

6.2.1 Definieer *konsentrasie* in woorde. (2)

6.2.2 Bereken die konsentrasie van die natriumhidroksie ( $\text{NaOH}$ ) oplossing. (4)

- 6.3 Natriumazied ( $\text{NaN}_3$ ) word in lugsakke van motors gebruik. Om die lugsak op te blaas, moet die volgende reaksie plaasvind:



Bereken die hoeveelheid stikstofgas ( $\text{N}_2$ ) wat by STD geproduseer word indien 55 g natriumazied volledig reageer.

(5)

[21]

**VRAAG 7 (Begin op 'n NUWE bladsy.)**

Die kunsmis ammoniumsulfaat ( $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ) word vervaardig uit die reaksie tussen swawelsuur ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ) en ammoniak ( $\text{NH}_3$ ) volgens die gebalanseerde vergelyking:



2 kg swawelsuur en 58,82 mol ammoniak is beskikbaar om die kunsmis te vervaardig.

- 7.1 Definieer die term *beperkende reagens*. (2)
- 7.2 Bereken die maksimum massa ammoniumsulfaat wat deur die reaksie geproduseer kan word. (7)  
[9]

**VRAAG 8 (Begin op 'n NUWE bladsy.)**

- 8.1 Beskou die chemiese reaksie hieronder:



- 8.1.1 Definieer 'n *basis* volgens die Lowry-Bronsted teorie. (2)
- 8.1.2 Skryf EEN gekonjugeerde suur-basispaar in die vergelyking neer. (1)
- 8.1.3 Is die reaksiemengsel SUUR of ALKALIES na voltooiing van die reaksie? Gee 'n rede vir jou antwoord. (2)
- 8.1.4 Skryf neer die formule van 'n stof in die reaksie, wat nie  $\text{H}_2\text{O}$  insluit nie, wat as 'n amfoliet kan optree. (2)

- 8.2 Koper (II) oksied ( $\text{CuO}$ ) reageer met salpetersuur.

Skryf 'n gebalanseerde vergelyking vir die reaksie neer. (3)

- 8.3 40 g ONSUIWER kalsiumkarbonaat reageer met 200  $\text{cm}^3$  verdunde swawelsuur met 'n konsentrasie van  $1,5 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$ . Al die kalsiumkarbonaat en swawelsuur reageer volledig en laat die onsuiwerhede oor na die voltooiing van die reaksie.




- 8.3.1 Bereken die persentasie suwerheid van die kalsiumkarbonaat. (6)

Om die swawelsuroplossing met 'n konsentrasie van  $1,5 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$  wat met die ONSUIWER kalsiumkarbonaat reageer, te verkry, is water by die 10  $\text{cm}^3$  gekonsentreerde swawelsuroplossing met konsentrasie  $9 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$  bygevoeg.

- 8.3.2 Bereken die volume water wat by die gekonsentreerde swawelsuroplossing bygevoeg is om 'n verdunde oplossing met 'n konsentrasie van  $1,5 \text{ mol}\cdot\text{dm}^{-3}$  te verkry. (4)  
[20]

**VRAAG 9 (Begin op 'n NUWE bladsy.)**

9.1 Beskou die gegewe redoksreaksie hieronder:



9.1.1 Definieer *oksidasiereaksie* in terme van elektronoordrag. (2)

Skryf neer die:

9.1.2 Formule van die reduseermiddel (2)

9.1.3 Reduksie-halfreaksie (2)

9.2 Beskou die redoksreaksie hieronder:



9.2.1 Bepaal die oksidasiegetal van stikstof (N) in  $\text{NO}_3^-$ . (2)

9.2.2 Balanseer die chemiese vergelyking hierbo met behulp van die ion-elektron metode. (4)

[12]

**VRAAG 10 (Begin op 'n NUWE bladsy.)**

10.1 Die mynbedryf dra tot die Suid-Afrikaanse ekonomie by. Goud is een van die minerale wat in Suid-Afrika gemyn word.

10.1.1 Skryf die naam van die gebied van die belangrikste mynbouaktiwiteit in Suid-Afrika neer. (1)

Die volgende chemiese reaksie vind tydens die laaste stappe in die herwinningsproses van goud plaas.



10.1.2 Is goud GEOKSIEERD of GEREDUSEER tydens die reaksie?

Verduidelik die antwoord deur na die oksidasiegetal te verwys. (3)

10.1.3 Die NaCN is een van die produkte wat tydens die reaksie vorm.

Gee 'n rede waarom 'n chemikus MOET toesien dat hierdie stof nie by nabygeleë waterbronne kom nie. (2)

10.1.4 Skryf die naam van die proses wat na die reaksie gevvolg word, neer. (1)

- 10.2 Die verbranding van fossielbrandstowwe het 'n negatiewe impak op die omgewing.

Skryf TWEE negatiewe gevolge van die verbranding van fossielbrandstowwe op groot skaal neer. (2)  
[9]

**TOTAAL:** 150

**NATIONAL SENIOR CERTIFICATE  
NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT**

**DATA FOR PHYSICAL SCIENCES GRADE 11  
PAPER 2 (CHEMISTRY)**

**GEGEWENS VIR FISIESE WETENSKAPPE GRAAD 11  
VRAESTEL 2 (CHEMIE)**

**TABLE 1: PHYSICAL CONSTANTS/TABEL 1: FISIESE KONSTANTES**

NAAM/NAME	SIMBOOL/SYMBOL	WAARDE/VALUE
Standard pressure <i>Standaarddruk</i>	$p^\theta$	$1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$
Molar gas volume at STP <i>Molêre gasvolume teen STD</i>	$V_m$	$22,4 \text{ dm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$
Standard temperature <i>Standaardtemperatuur</i>	$T^\theta$	273 K
Charge on electron <i>Lading op elektron</i>	e	$-1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$
Avogadro's constant <i>Avogadro se konstante</i>	$N_A$	$6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

**TABLE 2: FORMULAE/TABEL 2: FORMULES**

$n = \frac{m}{M}$ or/of $n = \frac{N}{N_A}$ or/of $n = \frac{V}{V_m}$	$c = \frac{n}{V}$ or/of $c = \frac{m}{MV}$ $\frac{c_a V_a}{c_b V_b} = \frac{n_a}{n_b}$	$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ $K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14}$ at /by 298K
$E^\theta_{\text{cell}} = E^\theta_{\text{cathode}} - E^\theta_{\text{anode}}$ / $E^\theta_{\text{sel}} = E^\theta_{\text{katode}} - E^\theta_{\text{anode}}$ $E^\theta_{\text{cell}} = E^\theta_{\text{reduction}} - E^\theta_{\text{oxidation}}$ / $E^\theta_{\text{sel}} = E^\theta_{\text{reduksie}} - E^\theta_{\text{oksidasie}}$ $E^\theta_{\text{cell}} = E^\theta_{\text{oxidising agent}} - E^\theta_{\text{reducing agent}}$ / $E^\theta_{\text{sel}} = E^\theta_{\text{oksideermiddel}} - E^\theta_{\text{reduseermiddel}}$		

TABLE 3: THE PERIODIC TABLE OF ELEMENTS/TABEL 3: DIE PERIODIEKE TABEL VAN ELEMENTE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 (III)	14 (IV)	15 (V)	16 (VI)	17 (VII)	18 (VIII)	2 He 4
1 (I)	$\text{H}$ $\sim 1$	$\text{Li}$ $\sim 3$	$\text{Be}$ $\sim 4$	$\text{B}$ $\sim 5$	$\text{C}$ $\sim 6$	$\text{N}$ $\sim 7$	$\text{O}$ $\sim 8$	$\text{F}$ $\sim 9$	$\text{Ne}$ $\sim 10$	$\text{Na}$ $\sim 11$	$\text{Mg}$ $\sim 12$	$\text{Al}$ $\sim 13$	$\text{Si}$ $\sim 14$	$\text{P}$ $\sim 15$	$\text{S}$ $\sim 16$	$\text{Cl}$ $\sim 17$	$\text{Ar}$ $\sim 18$	$\text{Kr}$ $\sim 19$	$\text{Xe}$ $\sim 20$
2 (II)	$\text{Ca}$ $\sim 40$	$\text{Sr}$ $\sim 48$	$\text{Ba}$ $\sim 56$	$\text{Ra}$ $\sim 62$	$\text{Ce}$ $\sim 140$	$\text{Pr}$ $\sim 141$	$\text{Nd}$ $\sim 144$	$\text{Pm}$ $\sim 150$	$\text{Sm}$ $\sim 152$	$\text{Eu}$ $\sim 157$	$\text{Gd}$ $\sim 159$	$\text{Tb}$ $\sim 163$	$\text{Dy}$ $\sim 167$	$\text{Ho}$ $\sim 169$	$\text{Er}$ $\sim 173$	$\text{Tm}$ $\sim 175$	$\text{Yb}$ $\sim 177$	$\text{Lu}$ $\sim 179$	
3 (III)	$\text{Sc}$ $\sim 45$	$\text{Ti}$ $\sim 51$	$\text{Cr}$ $\sim 55$	$\text{V}$ $\sim 59$	$\text{Mn}$ $\sim 59$	$\text{Fe}$ $\sim 59$	$\text{Co}$ $\sim 59$	$\text{Ni}$ $\sim 59$	$\text{Cu}$ $\sim 63,5$	$\text{Zn}$ $\sim 65$	$\text{Ga}$ $\sim 65$	$\text{Ge}$ $\sim 70$	$\text{As}$ $\sim 73$	$\text{Se}$ $\sim 75$	$\text{Br}$ $\sim 79$	$\text{Kr}$ $\sim 80$	$\text{Rb}$ $\sim 84$	$\text{Xe}$ $\sim 84$	
4 (IV)	$\text{Ta}$ $\sim 179$	$\text{W}$ $\sim 184$	$\text{Re}$ $\sim 186$	$\text{Os}$ $\sim 190$	$\text{Pt}$ $\sim 192$	$\text{Au}$ $\sim 195$	$\text{Hg}$ $\sim 197$	$\text{Ag}$ $\sim 201$	$\text{Pb}$ $\sim 204$	$\text{Bi}$ $\sim 207$	$\text{Po}$ $\sim 209$	$\text{At}$ $\sim 211$	$\text{At}$ $\sim 217$	$\text{Rn}$ $\sim 219$					
5 (V)	$\text{Nb}$ $\sim 92$	$\text{Zr}$ $\sim 91$	$\text{Mo}$ $\sim 96$	$\text{Tc}$ $\sim 101$	$\text{Ru}$ $\sim 103$	$\text{Rh}$ $\sim 106$	$\text{Pd}$ $\sim 108$	$\text{Ag}$ $\sim 112$	$\text{Cd}$ $\sim 115$	$\text{In}$ $\sim 119$	$\text{Sn}$ $\sim 122$	$\text{Te}$ $\sim 128$	$\text{I}$ $\sim 128$	$\text{I}$ $\sim 127$					
6 (VI)	$\text{Te}$ $\sim 76$	$\text{Se}$ $\sim 77$	$\text{S}$ $\sim 78$	$\text{O}$ $\sim 79$	$\text{S}$ $\sim 80$	$\text{P}$ $\sim 81$	$\text{Cl}$ $\sim 82$	$\text{F}$ $\sim 83$	$\text{Br}$ $\sim 84$	$\text{I}$ $\sim 85$	$\text{At}$ $\sim 86$								
7 (VII)	$\text{Cl}$ $\sim 39$	$\text{Ar}$ $\sim 40$	$\text{K}$ $\sim 45$	$\text{Ca}$ $\sim 51$	$\text{Sc}$ $\sim 55$	$\text{Ti}$ $\sim 59$	$\text{V}$ $\sim 63,5$	$\text{Cr}$ $\sim 65$	$\text{Mn}$ $\sim 65$	$\text{Fe}$ $\sim 65$	$\text{Co}$ $\sim 65$	$\text{Ni}$ $\sim 65$	$\text{Cu}$ $\sim 65$	$\text{Zn}$ $\sim 65$	$\text{Ge}$ $\sim 65$	$\text{As}$ $\sim 65$	$\text{Br}$ $\sim 65$		
8 (VIII)	$\text{Ar}$ $\sim 38$	$\text{Kr}$ $\sim 37$	$\text{Xe}$ $\sim 37$	$\text{Rb}$ $\sim 38$	$\text{Sr}$ $\sim 39$	$\text{Ca}$ $\sim 40$	$\text{Sc}$ $\sim 45$	$\text{Ti}$ $\sim 51$	$\text{V}$ $\sim 55$	$\text{Cr}$ $\sim 59$	$\text{Mn}$ $\sim 59$	$\text{Fe}$ $\sim 59$	$\text{Co}$ $\sim 59$	$\text{Ni}$ $\sim 59$	$\text{Cu}$ $\sim 59$	$\text{Zn}$ $\sim 59$	$\text{Ge}$ $\sim 59$	$\text{As}$ $\sim 59$	
9 (VIIIA)	$\text{Fr}$ $\sim 87$	$\text{Ra}$ $\sim 88$	$\text{Ac}$ $\sim 89$	$\text{Fr}$ $\sim 90$	$\text{Ra}$ $\sim 91$	$\text{Ac}$ $\sim 92$	$\text{Fr}$ $\sim 93$	$\text{Ra}$ $\sim 94$	$\text{Ac}$ $\sim 95$	$\text{Fr}$ $\sim 96$	$\text{Ra}$ $\sim 97$	$\text{Ac}$ $\sim 98$	$\text{Fr}$ $\sim 99$	$\text{Ra}$ $\sim 100$	$\text{Ac}$ $\sim 101$	$\text{Fr}$ $\sim 102$	$\text{Ra}$ $\sim 103$	$\text{Ac}$ $\sim 103$	

**TABLE 4A: STANDARD REDUCTION POTENTIALS**  
**TABEL 4A: STANDAARD REDUKSIEPOTENSIALE**

Half-reactions/Halfreaksies	$E^\theta$ (V)
$F_2(g) + 2e^- \rightleftharpoons 2F^-$	+ 2,87
$Co^{3+} + e^- \rightleftharpoons Co^{2+}$	+ 1,81
$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	+1,77
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$	+ 1,51
$Cl_2(g) + 2e^- \rightleftharpoons 2Cl^-$	+ 1,36
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$	+ 1,33
$O_2(g) + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons 2H_2O$	+ 1,23
$MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2H_2O$	+ 1,23
$Pt^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pt$	+ 1,20
$Br_2(l) + 2e^- \rightleftharpoons 2Br^-$	+ 1,07
$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightleftharpoons NO(g) + 2H_2O$	+ 0,96
$Hg^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Hg(l)$	+ 0,85
$Ag^+ + e^- \rightleftharpoons Ag$	+ 0,80
$NO_3^- + 2H^+ + e^- \rightleftharpoons NO_2(g) + H_2O$	+ 0,80
$Fe^{3+} + e^- \rightleftharpoons Fe^{2+}$	+ 0,77
$O_2(g) + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2O_2$	+ 0,68
$I_2 + 2e^- \rightleftharpoons 2I^-$	+ 0,54
$Cu^+ + e^- \rightleftharpoons Cu$	+ 0,52
$SO_2 + 4H^+ + 4e^- \rightleftharpoons S + 2H_2O$	+ 0,45
$2H_2O + O_2 + 4e^- \rightleftharpoons 4OH^-$	+ 0,40
$Cu^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cu$	+ 0,34
$SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightleftharpoons SO_2(g) + 2H_2O$	+ 0,17
$Cu^{2+} + e^- \rightleftharpoons Cu^+$	+ 0,16
$Sn^{4+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn^{2+}$	+ 0,15
$S + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2S(g)$	+ 0,14
$2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g)$	<b>0,00</b>
$Fe^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Fe$	- 0,06
$Pb^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Pb$	- 0,13
$Sn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Sn$	- 0,14
$Ni^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ni$	- 0,27
$Co^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Co$	- 0,28
$Cd^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cd$	- 0,40
$Cr^{3+} + e^- \rightleftharpoons Cr^{2+}$	- 0,41
$Fe^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Fe$	- 0,44
$Cr^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Cr$	- 0,74
$Zn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Zn$	- 0,76
$2H_2O + 2e^- \rightleftharpoons H_2(g) + 2OH^-$	- 0,83
$Cr^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Cr$	- 0,91
$Mn^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Mn$	- 1,18
$Al^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons Al$	- 1,66
$Mg^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Mg$	- 2,36
$Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na$	- 2,71
$Ca^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ca$	- 2,87
$Sr^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Sr$	- 2,89
$Ba^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ba$	- 2,90
$Cs^+ + e^- \rightleftharpoons Cs$	- 2,92
$K^+ + e^- \rightleftharpoons K$	- 2,93
$Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li$	- 3,05

Increasing oxidising ability/Toenemende oksiderende vermoë

Increasing reducing ability/Toenemende reducerende vermoë

**TABLE 4B: STANDARD REDUCTION POTENTIALS**  
**TABEL 4B: STANDAARD REDUKSIEPOTENSIALE**

Half-reactions/Halreaksies		$E^\theta$ (V)
$\text{Li}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-3,05
$\text{K}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-2,93
$\text{Cs}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-2,92
$\text{Ba}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-2,90
$\text{Sr}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-2,89
$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-2,87
$\text{Na}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-2,71
$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-2,36
$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-1,66
$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-1,18
$\text{Cr}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-0,91
$2\text{H}_2\text{O} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2(\text{g}) + 2\text{OH}^-$ -0,83
$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-0,76
$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-0,74
$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-0,44
$\text{Cr}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cr}^{2+}$ -0,41
$\text{Cd}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-0,40
$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-0,28
$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-0,27
$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-0,14
$\text{Pb}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-0,13
$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	-0,06
$2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2(\text{g})$ 0,00
$\text{S} + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2\text{S}(\text{g})$ +0,14
$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Sn}^{2+}$ +0,15
$\text{Cu}^{2+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}^+$ +0,16
$\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$ +0,17
$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}$ +0,34
$2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$4\text{OH}^-$ +0,40
$\text{SO}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{S} + 2\text{H}_2\text{O}$ +0,45
$\text{Cu}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Cu}$ +0,52
$\text{I}_2 + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{I}^-$ +0,54
$\text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{H}_2\text{O}_2$ +0,68
$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Fe}^{2+}$ +0,77
$\text{NO}_3^- + 2\text{H}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{NO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}$ +0,80
$\text{Ag}^+ + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Ag}$ +0,80
$\text{Hg}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Hg}(\ell)$ +0,85
$\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{NO}(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}$ +0,96
$\text{Br}_2(\ell) + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Br}^-$ +1,07
$\text{Pt}^{2+} + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Pt}$ +1,20
$\text{MnO}_2 + 4\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mn}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$ +1,23
$\text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_2\text{O}$ +1,23
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$ +1,33
$\text{Cl}_2(\text{g}) + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{Cl}^-$ +1,36
$\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O}$ +1,51
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{H}_2\text{O}$ +1,77
$\text{Co}^{3+} + \text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$\text{Co}^{2+}$ +1,81
$\text{F}_2(\text{g}) + 2\text{e}^-$	$\rightleftharpoons$	$2\text{F}^-$ +2,87

Increasing oxidising ability/Toenemende oksiderende vermoe

Increasing reducing ability/Toenemende reduuserende vermoe



Province of the  
**EASTERN CAPE**  
EDUCATION

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE/  
NASIONALE  
SENIOR SERTIFIKAAT**

**GRADE/GRAAD 11**

**NOVEMBER 2020**

**PHYSICAL SCIENCES P2/  
FISIESE WETENSKAPPE V2  
MARKING GUIDELINE/NASIENRIGLYN  
(EXEMPLAR/EKSEMPLAAR)**

**MARKS/PUNTE: 150**

---

This marking guideline consists of 12 pages./  
*Hierdie nasienriglyn bestaan uit 12 bladsye.*

---

**QUESTION 1/VRAAG 1**

- |      |      |     |
|------|------|-----|
| 1.1  | A √√ | (2) |
| 1.2  | C √√ | (2) |
| 1.3  | D √√ | (2) |
| 1.4  | C √√ | (2) |
| 1.5  | A √√ | (2) |
| 1.6  | B √√ | (2) |
| 1.7  | A √√ | (2) |
| 1.8  | A √√ | (2) |
| 1.9  | D √√ | (2) |
| 1.10 | B √√ | (2) |

**[20]****QUESTION 2/VRAAG 2**

- 2.1 The sharing of electrons between two atoms to form a molecule. ✓✓ /  
*Die deel van elektrone tussen twee atome om 'n molekuul te vorm.* (2)

2.2



- 2.3 2.3.1 C – H. ✓ O-atom has a smaller atomic radius than the C-atom. ✓  
*O-atoom het 'n 2 kleiner atomiese radius as die C-atoom.*

**OR/ OF**

C-atom has a larger atomic radius than the O-atom.  
*C-atoom het 'n groter atomiese radius as die O-atoom.* (2)

- 2.3.2 O - H ✓ (1)

- 2.4 Two / Twee ✓ **OR/OF 2** (1)

- 2.5 NH<sub>4</sub><sup>+</sup> ✓ (1)

2.6 N-atom is more electronegative than the H-atom. ✓

The NH<sub>3</sub> molecular geometry/charge distribution is asymmetrical ✓ / The electron density (charges) will be distributed unevenly around the molecule.

*N-atoom is meer elektron-negatief as die H-atoom*

*Die NH<sub>3</sub> se molekulêre geometrie/lading is asimmetries versprei /*

*Die elektrondigtheid (lading) sal oneweredig rondom die molekuul versprei wees.*

C-atom is more electronegative than the H-atom ✓ but CH<sub>4</sub> molecular geometry / charge distribution is symmetrical ✓

*C-atoom is meer elektron-negatief as die H-atoom maar die CH<sub>4</sub> molekulêre geometrie/lading verspreiding is simmetries.*

(4)

[13]

**QUESTION 3/VRAAG 3**

- 3.1 3.1.1 The temperature at which the vapour pressure of a liquid equals atmospheric pressure. ✓✓

*Die temperatuur waarteen die dampdruk van 'n vloeistof gelyk aan die atmosferiese druk is.* (2)

- 3.1.2 Gas ✓ (1)

- 3.1.3 Dipole-dipole ✓ (forces) / *Dipool-dipool (kragte)* (1)

- 3.1.4 **B** ✓ Compound **B** has larger molecular size ✓✓ / Compound **A** has a smaller molecular size

*Verbinding B het 'n groter molekulêre grootte / Verbinding A het 'n kleiner molekulêre grootte.* (3)

- 3.1.5 **A** ✓ Lower boiling point / ✓ *Laer kookpunt*

**OR/OF**

B has a higher boiling point / B het 'n hoër kookpunt (2)

- 3.1.6 Compound C / HF has hydrogen bonds. ✓  
HCl (A) and HBr (B) have dipole-dipole forces.

The hydrogen bonds / intermolecular forces in compound C / HF is stronger ✓ than the dipole-dipole forces / intermolecular forces in HCl (A) and HBr (B).

Therefore more energy will be required to overcome the intermolecular forces in HF (A). ✓

Verbinding C/HF het waterstofbindings.  
HCl (A) en HBr (B) het dipool-dipoolkragte.

Die waterstofbinding/intermolekulêrekragte in verbinding C / HF is sterker as die die dipool-dipoolkragte/intermolekulêrekragte in HCl (A) en HBr (B).

Daarom word meer energie benodig om die intermolekulêrekragte in HF (A te oorkom).

#### OR/OF

- Compound C / HF has hydrogen bonds. ✓  
HCl (A) and HBr (B) have dipole-dipole forces.

The dipole-dipole forces / intermolecular forces in compounds HCl (A) and HBr (B) is weaker ✓ than the intermolecular forces in HF (C)

Therefore less energy will be required to overcome the intermolecular forces in HCl (A) and HBr (B). ✓

Verbinding C / HF het waterstofbindings  
HCl (A) en HBr (B) het dipool-dipoolkragte

Die dipool-dipool/intermolekulêre kragte in verbindings HCl (A) en HBr (B) is swakker as die waterstofbinding/intermolekulêrekragte in HF (C).

Daarom word minder energie benodig om die intermolekulêrekragte in HCl (A) en HBr (B) te oorkom.

- 3.2 3.2.1 CCl<sub>4</sub> ✓ (1)

- 3.2.2 CCl<sub>4</sub> and I<sub>2</sub> have London forces only. ✓  
H<sub>2</sub>O has (London forces) and hydrogen bonds ✓  
Intermolecular forces in solution are of comparable magnitude (CCl<sub>4</sub>) ✓  
OR IMF in solution are not of comparable magnitude (H<sub>2</sub>O)  
CCl<sub>4</sub> en I<sub>2</sub> het slegs Londenkragte  
H<sub>2</sub>O het (londenkragte) en waterstofbindings OF  
Intermolekulêrekragte in oplossing is van vergelykbare grootte. (3)  
[16]

**QUESTION 4/VRAAG 4**

4.1 Charles' law ✓ / Charles se wet (1)

4.2 4.2.1 What effect will a change in temperature have on the volume of the gas? ✓✓/  
What is the relationship between temperature and volume of gas?

*Watter effek sal die verandering in temperatuur op die volume van die gas hê?*

*Wat is die verhouding tussen temperatuur en volume van die gas?*

**Marking guideline/Nasienriglyn**

- Correct independent and dependent variable
- *Korrekte onafhanklike en afhanklike veranderlike*
- In the form of a question
- *In die vorm van 'n vraag*

(2)

4.2.2 Pressure OR the amount of gas.

*Druk OF hoeveelheid gas*

Any one/Enige een ✓

(1)

4.3 Thermometer/ Termometer ✓ (1)

4.4 4.4.1  $\frac{T_1}{V_1} = \frac{T_2}{V_2}$  ✓

$$\frac{269}{66} \checkmark = \frac{T_2}{67} \checkmark$$

$$T_2 = 273,08 \text{ K}$$

$$R = 273,08 \checkmark (\text{K}) \quad (4)$$

4.4.2  $n = \frac{m}{M}$

$$n = \frac{132}{44} \checkmark$$

$$n = 3 \text{ mol}$$

$$pV = nRT \checkmark$$

$$p(66 \times 10^{-3}) \checkmark = (3)(8,31)(269) \checkmark$$

$$p = 101\ 608,64 \text{ Pa} \checkmark$$


(5)

- 4.5 Low temperature ✓ and high pressure ✓ / Lae temperatuur en hoë druk (2)
- 4.6 H<sub>2</sub> ✓  
H<sub>2</sub> has smaller molecules ✓ and weaker intermolecular forces ✓ /  
H<sub>2</sub> het kleiner molekules en swakker intermolekulêrekragte. (3)  
[19]

**QUESTION 5/VRAAG 5**

- 5.1 The minimum energy needed for a reaction to take place. ✓✓ /  
Die minimum energie wat benodig word vir 'n reaksie om plaas te vind. (2)
- 5.2 Reaction / Reaksie I. ✓  
The temperature of the reaction mixture increases. ✓  
Die temperatuur van die reaksiemengsel verhoog. (2)
- 5.3 NEGATIVE / NEGATIEF ✓ (1)
- 5.4 Catalyst / Katalisator ✓ (1)
- 5.5 LARGER THAN / GROTER AS ✓✓ (2)

- 5.6 Potential energy (kJ·mol<sup>-1</sup>)/  
Potensiële energie (kJ·mol<sup>-1</sup>)

**Marking criteria / Nasienkriteria**

Correct shape ✓  
Korrekte vorm

ΔH correctly indicated ✓  
ΔH korrek aangedui

E<sub>a</sub> correctly indicated ✓  
E<sub>a</sub> korrek aangedui

(3)  
[11]

**QUESTION 6/VRAAG 6**

- 6.1 6.1.1 The simplest whole number ratio of elements in a given compound ✓✓ /

*Die eenvoudigste heelgetalverhouding van elemente in 'n gegewe verbinding*

(2)

6.1.2  $n(C) = \frac{m}{M}$  ✓

$$n(C) = \frac{54,55}{12} \checkmark = 4,55 \text{ mol}$$

$$n(H) = \frac{9,09}{1} \checkmark = 9,09 \text{ mol}$$

$$n(O) = \frac{36,36}{16} \checkmark = 2,27 \text{ mol}$$

$$n(C) : n(H) : n(O)$$

$$\frac{4,55}{2,27} : \frac{9,09}{2,27} : \frac{2,27}{2,27} \checkmark$$

$$2 : 4 : 1$$

Empirical formula / Empiriese formule: C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>O<sub>1</sub> ✓

(6)

6.1.3 Ratio / Verhouding =  $\frac{\text{molar mass/molêre massa}}{\text{formula mass/formule massa}}$

$$\text{Ratio / verhouding} = \frac{88}{44} \checkmark$$

$$\text{Ratio / verhouding} = 2$$

Molecular formula / Molekulêre formule: C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> ✓

(2)

- 6.2 6.2.1 The amount of solute per litre/volume of solution ✓✓ /

*Die hoeveelheid opgeloste stof per liter/volume van oplossing*

(2)

$$6.2.2 \quad c = \frac{m}{MV} \checkmark$$

$$c = \frac{8}{(40) \checkmark (0,25)} \checkmark$$

$$c = 0,8 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \checkmark$$

$$\begin{aligned} n &= m/M \\ &= 8/40 \checkmark \\ &= 0,2 \text{ mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c &= n/V \\ &= 0,2/0,25 \checkmark \\ &= 0,8 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \checkmark \end{aligned}$$

for both formulae/  
vir beide formules

Marking guide / Nasienriglyn

- Formula / Formule ✓ ✓
- Substitution of / substitusie van 8 and / en 0,25 or/ of 0,2 and 0,25
- Substitution of / substitusie van 40/
- Final answer / Finale antwoord ✓

(4)

6.3  $\text{NaN}_3$

$$n = \frac{m}{M}$$

$$n = \frac{55}{65} \checkmark$$

$$n = 0,85 \text{ mol}$$

Any one / Enige een ✓

Mole ratio / molverhouding:  $\text{NaN}_3 : \text{N}_2$

2 : 3

$$n(\text{N}_2) = 0,85 \times \frac{3}{2} \checkmark$$

$$n(\text{N}_2) = 1,275 \text{ mol}$$

$$V = nV_m$$

$$V = (1,275)(22,4) \checkmark$$

$$V = 28,56 \text{ dm}^3 \checkmark$$

(5)  
[21]

## QUESTION 7/VRAAG 7

- 7.1 The substance that is completely used-up in a chemical reaction. ✓✓ /  
*Die stof wat volledig in 'n chemiese reaksie opgebruik word.* (2)

7.2

$H_2SO_4$ $n = \frac{m}{M}$ ✓ $n = \frac{2000}{98}$ ✓ $n = 20,41 \text{ mol}$	
Mole ratio / mol verhouding = $\frac{H_2SO_4}{NH_3}$ Mole ratio / mol verhouding = $\frac{1}{2} = 0,5$ ✓ Mole ratio / mol verhouding $= \frac{20,41}{58,82}$ ✓ = 0,34 Ratio smaller than / Verhouding kleiner as 0,5.	<b>OR / OF</b> Mole ratio / mol verhouding = $\frac{NH_3}{H_2SO_4}$ Mole ratio / mol verhouding $= \frac{2}{1} = 2$ Mole ratio / mol verhouding $= \frac{58,82}{20,41} = 2,88$ Ratio greater than / Verhouding groter as 2.
$H_2SO_4$ is the limiting reagent / $H_2SO_4$ is die beperkende reagens.	

$$n [(NH_4)_2SO_4] = 20,41 \times \frac{1}{1} = 20,41 \checkmark$$

$$m = nM$$

$$m = (20,21)(132) \checkmark$$

$$m = 2\ 667,72 \text{ g} \checkmark$$

(7)  
[9]

**QUESTION 8/VRAAG 8**

8.1 8.1.1 A base is a proton/H<sup>+</sup> ion acceptor. ✓✓ / 'n Basis is 'n protoon/H<sup>+</sup> foon-aanvaarder (2)

8.1.2 HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup> and/en PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>✓ OR/OF H<sub>3</sub>O<sup>+</sup> and/en H<sub>2</sub>O (1)

8.1.3 ACIDIC / SUUR. ✓ (Excess)/ (Oormaat) H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>✓ are produced / word geproduseer. (2)

8.1.4 HPO<sub>4</sub><sup>2-</sup>✓✓ (2)

8.2 CuO + 2HNO<sub>3</sub>✓ → Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> + H<sub>2</sub>O✓ ✓Balancing / Balansering

**Marking guide/ Nasienriglyn**

- Reactants / Reaktante
- Products / Produkte
- Balancing / Balansering

(3)

8.3 8.3.1

**Marking guide / Nasienriglyn**

- Formula / Formule n = cV
- Substitution into / Substitusie in n = cV
- Ratio / Verhouding CaCO<sub>3</sub>: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>: CaCO<sub>3</sub>: H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>
- Formula / Formule n = m/M
- Substitution / Substitusie of 100 into n = m/M
- Calculation of / Berekening van % Purity / Suiwerheid
- Final answer / Finale antwoord

nacid reacting / suur wat reageer het = cV ✓

$$= 1,5 \times 200/1000 \checkmark$$

$$= 3 \text{ mol}$$

M (CaCO<sub>3</sub>) used / gebruik = nM ✓

$$= 3 \times 100 \checkmark$$

$$= 30 \text{ g}$$

$$\% \text{ Purity/ Suiwerheid} = \frac{m_{\text{pure/suiwer}}}{m_{\text{impure/onsuiwer}}} \times 100$$

$$= 30/40 \times 100 \checkmark$$

$$= 75\% \checkmark$$

(6)

8.3.2 c<sub>1</sub>V<sub>1</sub> = c<sub>2</sub>V<sub>2</sub>

$$9 \times 10 \checkmark = 1,5 \checkmark V$$

$$60 \text{ cm}^3 = V_{\text{solution / oplossing}}$$

$$V_{\text{water}} = 60 - 10 \checkmark$$

$$= 50 \text{ cm}^3 \checkmark$$

(4)

[20]

**QUESTION 9/VRAAG 9**

9.1 9.1.1 Loss of electrons ✓✓ / Verlies van elektrone (2)

9.1.2 Zn ✓✓ (2)

9.1.3  $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$  ✓✓ (2)

9.2 9.2.1 + 5 ✓✓ (2)

9.2.2  $\text{Ag}(\text{s}) \rightarrow \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^-$  ✓

**Marking guideline/ Nasienriglyn**

Correct oxidation half reaction / Korrekte oksidasie halfreaksie

Correct reduction half reaction / Korrekte reduksie halfreaksie

Final reaction correct / Finale reaksie korrek

Balanced / Gebalanseerd

(4)  
[12]

**QUESTION 10/VRAAG 10**

10.1 10.1.1 Witwatersrand ✓ (1)

10.1.2 Reduced ✓ / Gereduseer/verminder

Oxidation number (of Au) decreases ✓✓ (from +1 to 0) /

Oksidasiegetal (van Au) verlaag (vanaf +1 tot 0) (3)

10.1.3 NaCN is harmful as it is poisonous to humans ✓✓ /  
NaCN is skadelik omdat dit giftig is vir mense (2)

10.1.4 Smelting ✓ (1)

10.2 10.2.1 Release of greenhouse gas / CO<sub>2</sub> / Global warming ✓  
Air pollutions/toxins released into air. ✓

Vrystelling van kweekhuisgas / CO<sub>2</sub> / Aardverwarming /  
Lugbesoedeling / gifstowwe wat in die lug vrygestel word.

(2)  
[9]

**TOTAL/TOTAAL: 150**